SCHEDEL



SCHEDEL (CRANIUM)

Anatomisch overzicht van het cranium en de aangezichtsbeenderen. Deze kaart toont de belangrijkste beenderen en sutuurgrenzen van het menselijk hoofd.

- Os frontale (voorhoofdsbeen)
- Sutura coronalis (kroonnaad)
- Neurocranium & Viscerocranium

Educatieve Disclaimer

Dit leermiddel is uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden en anatomische zelfstudie, niet voor medische diagnostiek of behandelingsadvies.

ANATOMISCHE SPECIFICATIES

ANATOMISCHE SPECIFICATIES & FUNCTIE

Functionele classificatie en klinische anatomie van de beenderen van de schedel:

- **Systeem:** *Skeletstelsel (Axiaal skelet)*
- **Botclassificatie:** *Platte beenderen (ossa plana) en onregelmatige beenderen (ossa irregularia)*
- **Primaire functie:** *Rigide mechanische bescherming van het cerebrum, cerebellum en de hersenstam*
- **Spieraanhechtingen:** *Aanhechtingsvlak voor mimische spieren en kauwspieren (zoals m. temporalis en m. masseter)*
- **Verbindingen:** *Synartrose (onbeweeglijke vezelverbindingen via schedelnaden zoals de sutura coronalis en sutura sagittalis)*

SKELETSTELSEL
(AXIAAL SKELET)



STUDIETIP: SPACED REPETITION

Overhoor eerst de Latijnse nomenclatuur aan de voorzijde voordat u de functionele specificaties controleert. Herhaal na 24 uur, 3 dagen en 1 week.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

COLUMNA VERTEBRALIS

Skeletsysteem • Kaart 02/50

- Cervicale lordose (C1-C7)
- Thoracale kyfose (Th1-Th12)
- Lumbale lordose (L1-L5)
- Sacrale kyfose (Os sacrum & Os coccygis)



ZELFOVERHORING CURVATUREN

Benoem de vier fysiologische krommingen in zijaanzicht van craniaal naar caudaal voordat je de kaart omdraait.

Deze kaart is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

Flashcard Achterzijde: Anatomie & Functie

Segmentverdeling & Wervelkolom-Anatomie

De volwassen wervelkolom telt gewoonlijk 33 tot 34 wervels verdeeld over vijf anatomische regio's, gescheiden door kraakbenige tussenwervelschijven.



- **Cervicale wervels (C1–C7):** 7 halswervels, waaronder atlas (C1) en axis (C2); gekenmerkt door een voorwaartse curvatuur (lordose).
- **Thoracale wervels (Th1–Th12):** 12 borstwervels met gewrichtsvlakken voor de ribben; achterwaartse curvatuur (kyfose).
- **Lumbale wervels (L1–L5):** 5 lendenwervels met massieve wervellichamen voor gewichtsbelasting; voorwaartse curvatuur (lordose).
- **Heiligbeen (Os sacrum):** 5 vergroeide sacrale wervels; vormt samen met het bekken een stabiele achterwaartse boog (kyfose).
- **Stuitbeen (Os coccygis):** 3 tot 5 kleine, vergroeide staartwervels die dienen als aanhechtingspunt voor bekkenbodemspieren.

Functionele Toelichting & Bescherming

De wervelkolom vervult een dubbele rol van biomechanische draagkracht en neurologische bescherming van het centrale zenuwstelsel.



- **Schokabsorptie:** De afwisselende lordose- en kyfosebogen fungeren als een dynamische veer. De tussenwervelschijven (disci intervertebrales) absorberen axiale compressiekrachten.
- **Zenuwbescherming en doorgang:** Het aaneengesloten wervelkanaal (canalis vertebralis) omsluit het ruggenmerg (medulla spinalis). Tussen aangrenzende wervels vormen de foramina intervertebralia de doorgang voor spinale zenuwen naar het perifere stelsel.

Educatieve Disclaimer

Dit materiaal is uitsluitend bestemd voor anatomische studie en onderwijsdoeleinden, niet voor medische diagnostiek of behandeladvies.

THORAX EN RIBBENBOOG

SKELETSTELSEL



Ventraal aanzicht

THORAX EN RIBBENBOOG

Systeem: Skeletstelsel (Kleurcode: Cyaan).
Structurele indeling van de benige borstkas in ventraal aanzicht.

- **Sternum** (Manubrium, Corpus, Processus xiphoideus)
- **Ware ribben** (Costae verae, I-VII): directe kraakbeenverbinding met het sternum
- **Valse ribben** (Costae spuriae, VIII-X): indirecte verbinding via ribbenboog (arcus costalis)
- **Zwevende ribben** (Costae fluctuantes, XI-XII): geen ventrale aanhechting

STUDIE-INSTRUCTIE

Benoem eerst de drie categorieën ribben en wijs het manubrium, corpus en processus xiphoideus aan op de voorzijde voordat u de kaart omdraait.

— Deze kaart is uitsluitend voor educatieve doeleinden. —

FUNCTIONELE ANATOMIE & FYSIOLOGIE

Fysiologische kernfuncties en gewrichtsrelaties van de thoraxwand ter ondersteuning van respiratie en orgaanbescherming.

- **Respiratoire biomechanica:** Vergroting van het intrathoracale volume tijdens inspiratie via het emmerhengsel- (ribben) en pomparm-mechanisme (sternum)
- **Cardiorespiratoire bescherming:** Biedt een rigide benig schild voor hart, grote vaten, longen en bovenste abdominale organen (lever, milt)
- **Articulaties:** Dorsaal verbonden via articulationes costovertebrales (caput costae met wervellichaam) en articulationes costotransversariae (tuberculum costae met processus transversus)
- **Ventrale articulatie:** Synchondroses en articulationes sternocostales via cartilago costalis

RESPIRATOIRE KINEMATIEK

Emmerhengsel-mechanisme (ribben)





(bucket-handle beweging)

Pomparm-mechanisme (sternum)





(pomparm-beweging)

DORSALE COSTOVERTEBRALE GEWRICHTSARTICULATIES



ORGAANBESCHERMING

- **Hart en grote vaten:** Bescherming door benige thorax en ribbenkraakbeen.
- **Longen:** Bescherming door ribbenboog en intercostale spieren.
- **Lever en milt:** Bescherming door de onderste ribben en costale boog.
- **Bovenste abdominale organen:** Onderste steun van de diafragma en costale marge.

1. SNIJDEN & VOORBEREIDEN

Knip langs de buitenste snijmarkeringen voor een exact formaat dat aansluit op het flashcard-systeem.

2. ACTIEVE HERINNERING

Bekijk de voorzijde (ventraal aanzicht), reproduceer de Latijnse nomenclatuur en controleer op de achterzijde de respiratoire functies en gewrichtsmechanismen.

Educatieve Disclaimer

Uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden ter voorbereiding op anatomie-examens. Niet bedoeld als medisch advies of klinische diagnosestelling.

SCHOUDERGORDEL



SCHOUDERGORDEL (CINGULUM PECTORALE)

Skeletsysteem • Kaart 04/50

- Clavicula (sleutelbeen)
- Scapula (schouderblad)
- Cavitas glenoidalis
- Acromion & Processus coracoideus

Flashcard 04/50 Achterzijde — Biomechanica & Verbinding

BIOMECHANICA & FUNCTIONELE VERBINDING

Verbindingsrol tussen axiaal en appendiculair skelet:

- **Enige benige verankering**: Articulatio sternoclavicularis (SC-gewricht) koppelt de schoudergordel aan het manubrium sterni.
- **Scapulothoracaal glijvlak**: Maakt dynamische translatie en rotatie van het schouderblad over de thoraxwand mogelijk (T2–T7).
- **Scapulohumeraal ritme**: 2:1 ratio (elke 2° glenohumerale abductie vraagt 1° laterale scapular tatie).
- **Dynamische stabiliteit**: Doordat de cavitas glenoidalis ondiep is, borgen het labrum glenoidale en de rotatorenmanchet de glenohumerale positie.

Sternoclaviculaire verankering



Scapulothoracaal glijmechanisme



Zelfoverhoring

→ Benoem de twee gewrichten die de clavicula verbinden met respectievelijk de romp en het schouderblad, en beredeneer welke bewegingsuitslag verloren gaat bij immobilisatie van het AC-gewricht.

Flashcard 05 — Voorzijde (Humerus)

HUMERUS



HUMERUS (OPPERARMBEEN)

Skeletstelsel | Bovenste extremiteit (Brachium) | Kaart 05 / 50

- Caput humeri (proximale gewrichtskop)
- Tuberculum majus & Tuberculum minus
- Epicondylus medialis & Epicondylus lateralis
- Trochlea humeri & Capitulum humeri
- Fossa olecrani (posterieur distaal)

Zelfoverhoring

Benoem de proximale gewrichtsdelen en distale epicondyli op de voorzijde voordat je de kaart omdraait.

Voor educatieve doeleinden. Niet voor medisch gebruik.

SKELETSTELSEL

Flashcard 05 — Achterzijde (Anatomische Toelichting)

FUNCTIONELE EN TOPOGRAFISCHE ANATOMIE

De humerus vormt het skeletale fundament van de bovenarm en verbindt het schoudergewricht proximaal met het ellebooggewricht distaal.

- **Proximale articulatie:** Caput humeri articuleert met de cavitas glenoidalis van de scapula (articulatio humeri).
- **Aanhechting rotatorenmanchet:** Tuberculum majus dient als insertie voor m. supraspinatus, m. infraspinatus en m. teres minor; tuberculum minus voor m. subscapularis.
- **Distaal ellebooggewricht:** Trochlea humeri articuleert met de incisura trochlearis van de ulna; capitulum humeri articuleert met de fovea capitis radii.
- **Neurovasculair traject:** De nervus radialis en arteria profunda brachii lopen schuin posterolateraal door de sulcus nervi radialis langs de humerusschacht.



Educatieve disclaimer
Uitsluitend bestemd voor anatomische studie en academische doeleinden; niet voor klinische diagnostiek of behandelbeslissingen.

Flashcard 06: Voorzijde

RADIUS EN ULNA



Rechter onderarm (anterieure aanzicht)

Alleen voor educatieve doeleinden. Geen vervanging voor professioonel medisch advies.

FUNCTIONELE ANATOMIE & GEWRICHTSRELATIES

- Skeletsysteem • **Kaart 06 / 50**
- **Pronatie & Supinatie:** De radius draait over de relatief stationaire ulna rond een schuine lengteas via de articulatio radioulnaris proximalis en distalis.
- **Ellebooggewricht (proximaal):** De fovea capitis radii articuleert met het capitulum humeri; de incisura trochlearis van de ulna omsluit de trochlea humeri voor flexie en extensie.
- **Polsgewricht (distaal):** Het brede distale uiteinde van de radius articuleert direct met het os scaphoideum en os lunatum in de articulatio radiocarpalis; de ulna articuleert mediaal indirect via de discus articularis triangularis (TFC).



MEMBRANA INTEROSSEA ANTEBRACHII

TIP

De vezels lopen schuin van caudaal-lateraal (radius) naar craniaal-mediaal (ulna) en verdelen longitudinale compressiekrachten van de hand en radius effectief naar de ulna.

Voor educatieve doeleinden. Geen vervanging voor professioonel medisch advies.

OSSA CARPI & METACARPI



Kaartvoorzijde: Ossa Carpi & Metacarpi (Dorsaal Aanzicht)

Dorsaal aanzicht van het skelet van de pols en de hand ter identificatie van de individuele botstructuren.

- Proximale rij carpalia (radiaal naar ulnair): Os scaphoideum, Os lunatum, Os triquetrum, Os pisiforme
- Distale rij carpalia (radiaal naar ulnair): Os trapezium, Os trapezoideum, Os capitatum, Os hamatum
- Ossa metacarpi: Metacarpale I t/m V (basis, corpus, caput)
- Falangen: Phalanx proximalis, media en distalis (digiti II-V); phalanx proximalis en distalis (digitus I)

Educatieve Disclaimer

Uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden bij anatomische zelfstudie.

CARPALETUNNEL & MECHANICA



KAARTACHTERZIJDE: CARPALETUNNEL, BOTVOLGORDE & GRIJPMECHANISMEN

Topografische relaties, carpale doorgang en functionele kinesiologie van de handwortel en vingers.

- **Mnemoniek botvolgorde** (radiaal naar ulnair):
  Some Lovers Try Positions That They Can't Handle
  (Scaphoideum, Lunatum, Triquetrum, Pisiforme, Trapezium, Trapezoideum, Capitatum, Hamatum)
- **Begrenzing Carpaletunnel:** Bodem en laterale wanden door de sulcus carpi; bindweefseldak door het retinaculum flexorum (ligamentum carpi transversum).
- **Inhoud Carpaletunnel:** 4 pezen m. flexor digitorum superficialis, 4 pezen m. flexor digitorum profundus, 1 pees m. flexor pollicis longus, en de nervus medianus.
- **Functionele grijptypen:** Krachtgreep (vingerflexie ondersteund door carpale stabilisatie) en precisiegreep (duimoppositie via het articulatio carpometacarpalis I zadelgewricht).

Klinische Relevantie: Carpaletunnelsyndroom & Scaphoideumfractuur

Compressie van de n. medianus leidt tot sensibele uitval in digiti I–III en radiale zijde van IV. Fracturen van het os scaphoideum dragen verhoogd risico op avasculaire necrose door retrograde arteriële vascularisatie.

Deze kaart is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden en vervangt geen professioneel medisch advies.

PELVIS & OS COXAE



Bekkengordel (Pelvis)

Anatomische structuren van het benige bekken en de heupbeenderen:

- Os ilium (darmbeen) met crista iliaca
- Os ischium (zitbeen) met tuber ischiadicum
- Os pubis (schaambeen)
- Symphysis pubica (schaambeenvoeg)
- Acetabulum (heupkom voor articulatie met caput femoris)

Skeletsysteem

Onderdeel van de bekkengordel (cingulum pelvicum) — verbindt het axiale skelet met de onderste extremiteiten.

(Alleen voor educatieve doeleinden)

SKELETSYSTEEM • KAART 08/50

Bekkengordel — Flashcard Achterzijde

Functionele Eigenschappen & Dimorfie

Biomechanische krachtoverdracht, functionele oriëntatie en morfologische variaties:

- **Gewichtsdragende transmissie:** Efficiënte geleiding van het rompgewicht via het os sacrum en de sacro-iliacale gewrichten direct naar de heupbeenderen en femora.
- **Seksuele dimorfie:** Het vrouwelijke bekken bezit een bredere en rondere bekkeningang met een stompe schaambeenhoek (arcus pubicus > 90°); het mannelijke bekken is dieper, zwaarder gebouwd en heeft een spitse hoek (arcus pubicus < 70°).
- **Geboortekanaalanatomie:** De apertura pelvis superior (bekkeningang) en apertura pelvis inferior (bekkenuitgang) bepalen de benige doorgang tijdens de baring.
- **Zit- en spieraanhechting:** Het tuber ischiadicum fungeert als dragend steunpunt tijdens de zithouding en vormt de origo voor de ischiocrurale musculatuur (hamstrings).





Educatieve noot

Bestemd voor anatomische zelfstudie en begrip van biomechanische verhoudingen.

Alleen voor educatief gebruik.

FEMUR



VENTRAAL AANZICHT
(VOORZIJDE)

DORSAAL AANZICHT
(ACHTERZIJDE)

VOORZIJDE: DIJBEEN (OS FEMORIS)

Skeletsysteem • Kaart 09 / 50 • Ventraal en Dorsaal Aanzicht

- Caput femoris (Femurkop) met fovea capitis
- Collum femoris (Femurnek)
- Trochanter major & Trochanter minor
- Corpus femoris met linea aspera (dorsaal)
- Condylus medialis & Condylus lateralis
- Facies patellaris (ventraal gewrichtsvlak)

Systeemsortering

Skeletstelsel — Okergeel markeringslabel.

Educatief gebruik — geen vervanging voor professioonel medisch advies.

DIJBEEN: BIOMECHANICA & FUNCTIE

PROXIMALE FEMUR (DOORSNEDE)



KRACHTOVERDRACHT HEUPGEWRICHT



ACHTERZIJDE: KERNFUNCTIES & KLINISCHE ANATOMIE

Functionele biomechanica, botarchitectuur en klinische correlaties van het langste en sterkste pijpbeen in het menselijk lichaam.

- **Biomechanica & Draagkracht:** Vormt de dragende hefboomarm van de onderste extremiteit; geleidt axiale lichaamsbelasting van het bekken (acetabulum) naar de tibia.
- **Trabeculaire Architectuur:** Spongieus bot met druk- en trekspoorlijnen (bundels van Ward) in collum en caput ter absorptie van piekbelasting.
- **Klinische Relevantie:** Collum femoris vormt een kritieke breukzone bij osteoporose (heupfractuur); risico op avasculaire femurkopnecrose bij verstoring van de a. circumflexa femoris medialis.
- **Spierinserties:** Belangrijke aanhechting voor heupabductoren (trochanter major), m. iliopsoas (trochanter minor) en de adductorengroep langs de linea aspera.

SKELETSTELSEL #09

Educatieve Disclaimer
Uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden. Deze informatie dient voor anatomische studie en vormt geen medisch diagnostisch of behandeladvies.

KNIE EN ONDERBEEN



Flashcard Voorzijde — Knie en Onderbeen Structuur

KNIE EN ONDERBEEN

Patella, Tibia & Fibula — Skeletsysteem (Code: Geel/Oker). Bestudeer de anatomische oriëntatie, gewrichtsvlakken en benige uitsteeksels.

- Patella (Knieschijf)
- Tibia (Scheenbeen) met Tuberositas tibiae
- Fibula (Kuitbeen)
- Malleolus medialis & Malleolus lateralis

Studie-instructie & Spaced Repetition

Bekijk eerst de voorzijde en benoem blindelings de aangeduide structuren en botpunten. Keer de kaart om ter verificatie van mechanische functies en spierinserties.

Deze kaart is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden.

FLASHCARD ACHTERZIJDE – KNIE EN ONDERBEEN FUNCTIE & BIOMECHANICA

STRUCTUUR & FUNCTIONELE ANATOMIE

Overzicht van de functionele biomechanica, gewichtsoverdracht en hefboomwerking van het onderbeen.

- **Patella:** Sesambeen ingebed in de quadricepspees; vergroot de hefboomarm van de m. quadriceps femoris tijdens kniesstrekking.
- **Tibia (Scheenbeen):** Primair gewichtdragend bot van het onderbeen; geleidt krachten van het femur rechtstreeks naar de talus.
- **Tuberositas tibiae:** Ventrale benige verhevenheid; dient als insertiepunt voor het ligamentum patellae.
- **Fibula (Kuitbeen):** Niet-gewichtdragend stabilisatiebot; fungeert als aanhechtingsvlak voor onderbeenspieren en vormt lateraal de enkelvork.
- **Malleoli:** De mediale malleolus (tibia) en laterale malleolus (fibula) vergrendelen de talus in het bovenste spronggewricht (articulatio talocruralis).



EDUCATIEVE DISCLAIMER

Dit materiaal is uitsluitend bestemd voor academische en educatieve doeleinden en vormt geen medische diagnose, behandelplan of klinisch advies.

STAP 1: ACTIEVE REPRODUCTIE

Dek de achterzijde af. Wijs op de voorzijde de tuberositas tibiae en beide malleoli aan en benoem hun gewrichtsrelaties.



STAP 2: MECHANISCHE CONTROLE

Controleer of u het verschil in krachtenverdeling tussen tibia (axiale belasting) en fibula (spieraanhechting/mortise) correct hebt geformuleerd.



Dit materiaal is uitsluitend bestemd voor academische en educatieve doeleinden en vormt geen medische diagnose, behandelplan of klinisch advies.

Flashcard U11 —
Voorzijde: Anatomisch Voetskelet

VOETSKELET

Voetskelet: Tarsus, Metatarsus & Phalanges (Overzicht)

Flashcard-voorzijde: Gedetailleerde weergave van het rechter voetskelet in zowel dorsaal als mediaal perspectief. Kleurcodering skeletstelsel: Ivoorwit en zandgeel met cyaanblauwe markering van gewrichtskraakbeen.

- **Talus (sprongbeen):** overbrenging van lichaamsgewicht canuit het onderbeen naar de voetwortel.
- **Calcaneus (hielbeen):** grootste voetwortelbeen, vormt het posterieure steunpunt en aanhechting voor de achillespees.
- **Tarsus (voetwortel):** os naviculare, os cuboideum en de drie ossa cuneiformia (mediale, intermedium, laterale).
- **Metatarsus** (middenvoetsbeenderen I-V): vormen de overgang naar de voorvoet.
- **Phalanges (tenen):** digiti II-V bezitten elk 3 falanxen; de hallux (grote teen) bezit er 2.

Educatieve Disclaimer

Deze anatomische kaart is uitsluitiend bestemd voor educatieve doeleinden en studie. Het is geen medisch diagnose- of behandel-instrument.

Dorsaal aanzicht



Mediaal aanzicht



FLASHCARD U11 — ACHTERZIJDE: FYSIOLOGIE & VOETBOGEN

FUNCTIONELE FYSIOLOGIE & KINETISCHE KETEN

Flashcard-achterzijde: **Mechanische analyse van de** voetboogarchitectuur, elastische energieopslag en dynamische gewrichtsinteracties tijdens de loopcyclus.

- **Mediale longitudinale boog:** gevormd door calcaneus, talus, os naviculare, ossa cuneiformia en ossa metatarsalia I–III; vangt verticale schokken op.
- **Laterale longitudinale boog:** gevormd door calcaneus, os cuboideum en ossa metatarsalia IV–V; primair belast bij afwikkeling en stabiliteit.
- **Transversale boog:** loodrechte welving ter hoogte van de ossa cuneiformia en cuboideum voor transversale stijfheid.
- **Plantaire fascia (aponeurosis plantaris):** fungeert via het windlass-mechanisme als strakke peesplaat die de voetboog verstevigt bij dorsaalflexie van de hallux.
- **Kinetische transmissie:** vormt de elastische schakel tussen grondreactiekrachten en de heup- en knie-extensoren.

Studiemethode: Spaced Repetition

Beoordeel eerst de structuren op de voorzijde zonder de toelichting te bekijken. Draai de kaart om en herheal de fysiologische functies volgens oplopende intervallen (1, 3, 7 en 14 dagen).

STAPPEN

1. **Identificeer de beendergroepen**
   Lokaliseer van proximaal naar distaal de proximale tarsus (talus, calcaneus), distale tarsus, middenveot (I–V) en tenen.
2. **Analyseer het windlass-mechanisme**
   Verklaar hoe tensie op de fascia plantaris de mediale boog opricht tijdens het afwikkelen van de voet.

VOETBOOGARCHITECTUUR



TRANSVERSALE BOOG



PLANTAIRE FASCIA (APONEUROSIS PLANTARIS)



KINETISCHE KETEN TIJDENS GANG



Deze flashcard is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en vervangt geen professioneel medisch advies.

MUSCULUS PECTORALIS MAJOR



MUSCULUS PECTORALIS MAJOR

Grote borstspier — Ventraal aanzicht van de thoracale wand met spiervezelverloop naar het proximale humerusgedeelte.

- **Systeem:** Spierstelsel (Musculair)
- Pars clavicularis (sleutelbeengedeelte): craniale vezelbundel
- Pars sternocostalis (borstbeen-ribbengedeelte): centrale spiermassa
- Pars abdominalis (buikgedeelte): caudale vezelrichting
- **Vezeltraject:** convergeert lateraalwaarts naar de crista tuberculi majoris humeri

TIP!

LEIDRAAD ZELFSTUDIE (VOORZIJDE)

Bekijk het vezelverloop en benoem de drie afzonderlijke spierkoppen hardop voordat je de kaart omdraait.

— Deze kaart is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden. —

MUSCULUS PECTORALIS MAJOR

— KAARTACHTERZIJDE —

FUNCTIONEEL EN ANATOMISCH PASPOORT

Volledige anatomische referentie, origo, insertie, innervatie en biomechanische functies.

ORIGO

- **Origo pars clavicularis**: mediale helft van de clavicula anterior
- **Origo pars sternocostalis**: sternum en kraakbeen van rib 1 t/m 6
- **Origo pars abdominalis**: voorste blad van de rectusschede (aponeurosis m. obliqui externi abdominis)



INSERTIE

- **Insertie**: Crista tuberculi majoris humeri (laterale rand van de sulcus intertubercularis)

FUNCTIE

- **Hoofdfuncties**: Adductie en endorotatie (binnenwaartse rotatie) van de humerus in het articulatio humeri
- **Nevenfuncties**: Anteflexie / flexie (vooral pars clavicularis) en depressie van de schoudergordel / thoracale hulpademhaling bij gefixeerde arm



INNERVATIE

- **Innervatie**: Nervus pectoralis medialis en nervus pectoralis lateralis (Plexus brachialis, C5-Th1)

SPACED REPETITION & ZELFCONTROLE

Geef jezelf een score van 1 tot 5 op basis van hoe nauwkeurig je de drie origo-zones en de adductie/endorotatie functies kon reproduceren.

STAP 1: ACTIEVE REPRODUCTIE

Noem uit het hoofd de aanhechtingsplaats op de humerus (crista tuberculi majoris) en de twee primaire bewegingsassen.

STAP 2: SORTERING & SPACED REPETITION

Plaats de kaart bij correct antwoord in stapel '3 dagen', bij hapering in stapel 'morgen opnieuw'.

NOTITIES VOOR KLINISCHE PALPATIE OF KRACHTTEST

EDUCATIEVE DISCLAIMER

Dit flashcard-materiaal is uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden ten behoeve van studenten en docenten. Het vormt geen medische diagnose, behandelvoorschrift of klinisch behandeladvies.

MUSCULUS DELTOIDEUS

SPIERSYSTEEM

Schoudergordel en Bovenarm

Driedelige schouderspier die de contour van de schouder vormt en primair verantwoordelijk is voor abductie van de arm boven 15 graden.



- Pars clavicularis (voorste vezels): clavicula (laterale derde)
- Pars acromialis (middelste vezels): acromion van de scapula
- Pars spinalis (achterste vezels): spina scapulae

STUDIESTAP VOORZIJDE

Bekijk de driedelige spierbundels): Benoem de drie verschillende anatomische origo's en hun gezamenlijke insertiepunt voordat u de kaart omdraait.

Deze kaart is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

SPIERSTELSEL

FLASHCARD ACHTERZIJDE: ANATOMIE & FUNCTIE

ANATOMISCHE DETAILS EN FUNCTIE

Kleurcode Spiersysteem: Rood / Koraal • Kaart 13 van 50

Origo: • Laterale derde deel van de clavicula (pars clavicularis), acromion (pars acromialis), en spina scapulae (pars spinalis)

Insertie: • Tuberositas deltoidea op het midden van de laterale schacht van het humerusbot

Innervatie: • Nervus axillaris (spinale segmenten C5, C6)



Hoofdfunctie:

- Krachtige abductie van de arm in het glenohumerale gewricht vanaf circa 15° tot 90° (geïnitieerd door de m. supraspinatus).

Synergie:

- Pars clavicularis verzorgt anteflexie en endorotatie; pars spinalis verzorgt retroflexie en exorotatie; ondersteunt armheffing in samenwerking met de m. trapezius en m. serratus anterior.

EDUCATIEVE DISCLAIMER

Dit leermiddel is uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden en anatomische studie. Het dient niet als medische diagnose of klinisch behandeladvies.

Eigen notities / Klinisch relevantiegeheugen

SPACED REPETITION EVALUATIE

1. **Actieve Herinnering**
   Lees de term op de voorzijde en visualiseer de drie delen (pars clavicularis, pars acromialis, pars spinalis) zonder naar de achterzijde te kijken.
2. **Functie- en Insertiecheck**
   Benoem de insertie (tuberositas deltoidea) en de bewegingsrichtingen per deelbundel. Draai om ter controle.
3. **Spaced Repetition Stapel**
   Plaats de kaart bij een correcte herinnering in de weekstapel; herhaal binnen 24 uur bij aarzeling of onjuiste origo-benoeming.

BICEPS BRACHII



MUSCULUS BICEPS BRACHII

Anatomische leereenheid voorzijde: Bovenarmmusculatuur (ventraal compartiment). Bestudeer de twee koppen en hun aanhechtingspunten nauwkeurig.

- **Caput longum:** ontspringt aan het tuberculum supraglenoidale van het schouderblad en loopt door de sulcus intertubercularis
- **Caput breve:** ontspringt aan de processus coracoideus van de scapula
- **Distale insertie:** hecht gezamenlijk aan op de tuberositas radii van het spaakbeen en via de bicipitale aponeurose in de fascia antebrachii

Kleurcodering Spierstelsel

Deze kaart behoort tot de categorie Spierstelsel (Kleurcode: Karmijnrood). Gebruik de snijlijnen aan de buitenzijde om de kaart op standaard flashcard-formaat (A6) uit te snijden.

Deze kaart is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden.

MUSCULAIRE SYSTEEM

WERKING EN FUNCTIONELE ANATOMIE

Anatomische leereenheid achterzijde: Fysiologische functies en biomechanica van de musculus biceps brachii rond het elleboog- en schoudergewricht.



- **Elleboogflexie:** voornaamste buiger van het ellebooggewricht bij een gesupineerde onderarm
- **Onderarmsupinatie:** krachtigste supinator van de onderarm, met name effectief wanneer de elleboog 90 graden gebogen is
- **Schouderstabilisatie:** caput longum draagt actief bij aan het centreren en stabiliseren van de humeruskop in de cavitas glenoidalis
- **Schouderflexie:** assisteert in lichte mate bij anteflexie en abductie van de bovenarm



EDUCATIEVE DISCLAIMER

Dit materiaal is uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden ten behoeve van anatomiestudie en vormt geen medische diagnose of behandelrichtlijn.

1 SPACED REPETITION STAP 1

Bekijk de term en illustratie op de voorzijde en reproduceer actief origo, insertie en hoofdfuncties uit het geheugen.

2 SPACED REPETITION STAP 2

Draai de kaart om ter verificatie. Sorteer de kaart in bak 1 (dagelijks) bij aarzeling, of bak 2 (wekelijks) bij vlekkeloze herinnering.

FLASHCARD HANDLEIDING

Flashcard Introductie & Snijhandleiding

HANDLEIDING FLASHCARD PRODUCTIE & SPACED REPETITION

Deze flashcardset is ontworpen als een compact, tactiel leermiddel om parate kennis van het bewegingsapparaat te verankeren. Voor een optimaal resultaat print u de pagina dubbelzijdig over de korte zijde (landscape) op stevig papier van minimaal 200 g/m² en snijdt u langs de stippellijnen.

- **Systeemclassificatie:** Kleurcode Rood/Magenta duidt op het Spierstelsel.
- **Leercyclus:** Beoordeel de voorzijde en benoem de drie koppen en insertie alvorens om te draaien.
- **Leitner-systeem:** Rangschik kaarten die u direct beheerst in box 3; herhaal foutieve kaarten dagelijks in box 1.
- **Disclaimer:** Dit materiaal dient uitsluitend voor educatieve doeleinden en vervangt geen medische diagnose of handelen.

Studiestrategie: Spaced Repetition

Verbind de visuele topografie van het olecranon met de biomechanische hefboomwerking voordat u de antagonistische interactie memoriseert.

1 CARDSNIJDEN



Snijd langs de stippellijnen en gebruik de crop-marks voor de juiste kaartgrootte.

2 200 g/m² PAPIER



Print dubbelzijdig over de korte zijde (landscape) op stevig papier van minimaal 200 g/m².

3 LEITNER-SYSTEEM



Rangschik kaarten die u direct beheerst in box 3; herhaal foutieve kaarten dagelijks in box 1.

1 STAP 1: INSPECTIE



Bekijk de geïllustreerde voorzijde en identificeer caput longum, caput laterale en caput mediale.

2 STAP 2: RECALL & ACTIE



Verifieer op de achterzijde de origines, de insertie op het olecranon en de functies bij elleboogextensie en schouderadductie.

Dit materiaal dient uitsluitend voor educatieve doeleinden en vervangt geen medische diagnose of handelen.

MUSCULUS TRICEPS BRACHII



VOORZIJDE: MUSCULUS TRICEPS BRACHII

Anatomische term: Musculus Triceps Brachii (Driekoppige armstrekker).
Systeem: Spiersteslel (Kleurcode Magenta).
Topografische regio: Dorsale compartiment van de bovenarm (brachium).

- **Caput longum (Lange kop):** ontspringt aan het tuberculum infraglenoidale van de scapula.
- **Caput laterale (Zijwaartse kop):** ontspringt aan de posterieure zijde van de humerus, proximaal van de sulcus nervi radialis.
- **Caput mediale (Middelste/diepe kop):** ontspringt aan de posterieure zijde van de humerus, distaal van de sulcus nervi radialis.
- **Gemeenschappelijke distale peesinsertie:** Processus olecrani (olecranon) van de ulna.

Visueel Herkenningspunt
Het caput longum overbrugt sowel het schouder- als het ellebooggewricht (bi-articulair), tewrijl de laterale en mediale koppen mono-articulair over het ellebooggewricht lopen.

Deze informatie is uitsluitend bedeld voor educatieve doeleinden.

SPIERSTELSEL: EXTENSOREN

Flashcard Achterzijde: M. Triceps Brachii Functie & Innervatie

ACHTERZIJDE: FUNCTIONELE ANATOMIE & MECHANICA

Functionele analyse, innervatie en kinetische keten van de Musculus Triceps Brachii.

- **Hoofdfunctie** (articulatio cubiti):
  Krachtige extensie (strekking) van de onderarm ter hoogte van het ellebooggewricht.
- **Secundaire functie** (articulatio humeri):
  Caput longum assisteert bij retroversie en adductie van de arm naar de romp, en stabiliseert de humeruskop in da cavitas glenoidalis.
- **Antagonistische balans:**
  Vormt het functionele tegenwicht voor de flexoren van de bovenarm (m. biceps brachii en m. brachialis).
- **Innervatie:**
  Nervus radialis (wortels C6, C7, C8).
- **Vatvoorziening:**
  Arteria profunda brachii.



Klinisch-Biomechanische Aantekening

Bij een uitval van de nervus radialis treedt verlies van actieve elleboogstrekking op ('dropping forearm'). Dit onderstreept het cruciale belang van de drie koppen bij revalidatie en krachttraining.

Zelfoverhoring: Benoem de 3 origines uit het hoofd

1.
2.

Beheersingsscore (Box 1, 2 of 3)

☐

FLASHCARD 16: MUSCULUS RECTUS ABDOMINIS (VOORZIJDE EN ACHTERZIJDE)

SPIERSTELSEL - KAART 16/50

MUSCULUS RECTUS ABDOMINIS



STUDEERTIP: ACTIEVE HERINNERING

Bekijk eerst de voorzijde van de kaart en benoem de aanhechtingen, oriëntatie en peesstructuren hardop voordat je de achterzijde controleert.

SPIERSTELSEL - KAART 16/50

MUSCULUS RECTUS ABDOMINIS

Origo (Oorsprong):

- Crista pubica en symphysis pubica (schaambeen)

Insertie (Aanhechting):

- Cartilagines costales van ribben 5 t/m 7 en processus xiphoideus van het sternum

Innervatie:

- Nervi intercostales (thoracale zenuwen T7 tot T11) en nervus subcostalis (T12)

Functies:

- **Hoofdfunctie 1 (Flexie):** Ventrale flexie van de thoracale en lumbale wervelkolom (rompbuiging).
- **Hoofdfunctie 2 (Bekkenkanteling):** Retroversie van het bekken (achteroverkanteling) bij gefixeerde thorax.
- **Hoofdfunctie 3 (Intra-abdominale druk):** Compressie van de buikorganen bij geforceerde expiratie, hoesten en persen.

KLINISCHE & FUNCTIONELE SAMENHANG

Samen met de dieper gelegen musculus transversus abdominis en de musculi obliqui vormt de rectus abdominis het actieve korset ter stabilisatie van de lumbale wervelkolom.

— Deze kaart is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. —

FLASHCARD GEBRUIKS- EN SNIJHANDLEIDING

GEBRUIKSINSTRUCTIE & SNIJRICHTLIJNEN FLASHCARDS

Praktische richtlijn voor het afdrukken, snijden en periodiek herhalen van de 50 flashcards uit deze set.

- [x] Afdrukken: Dubbelzidig afdrukken op 250–300 g/m² papier (duplex over de korte sijde)
- [x] Kleurcodering: Rood/Magenta = Spiersysteem, Cyaan = Skeletstelsel, Lime/Geel = Viscerale organen
- [x] Snijden: Snijd strak langs de aanggaeven gestippelde trimkaders en hoekmarkeringen
- [x] Spaced Repetition: Sorteer beheerste kaarten naar de wekeiljkke herhaalstapel en onbeheerste near de dagelijske stapel
- [x] Disclaimer: Uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden; vervangt geen klinisch-medische diagnostiek of instructie

KWALITEITSWAARSCHUWING

Controleer bij het printen of schalen op 100% (werkeiljke grootte) staat ingesteld, zodat voor- en achterzijde exact uitlijnen.

- = Spiersysteem — MUSCULAIR
- = Skeletstelsel — SKELETAAL
- = Viscerale organen — VISCERAAL

1 STAP 1: AFDRUKKEN EN SNIJDEN

Print de flashcardbladen op stevig kartonpapier en snijd met liniaal en stanleymes langs de buitenste snijlijnen.



2 STAP 2: SORTEREN OP SYSTEEM

Verdeel de 50 kaarten in de drie basissystemen aan de hand van de kleurgecodeerde systeembanden bovenaan elke kaart.

3 STAP 3: SPACED REPETITION CYCLUS

Neem dagelijks de actieve stapel door. Verplaats kaarten die je drie opeenvolgende dagen correct benoemt naar de wekelijkse onderhoudsbak.

SNIJLIJNEN & HOEKMARKERINGEN



DUPLEX PRINT ALIGNMENT



KLEUREN = SYSTEEM

- MUSCULAIR
- SKELETAAL
- VISCERAAL

Uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden; vervangt geen klinisch-medische diagnostiek of instructie.

MUSCULUS LATISSIMUS DORSI



Kaart 17 - Voorzijde: M. Latissimus Dorsi

VOORZIJDE • SPIERSTELSEL

Musculus latissimus dorsi (brede rugspier). Brede, platte en waaiervormige spier die het dorsale en laterale deel van de lagere romp overspant en convergeert naar de proximale humerus.

- **Systeem:** Spiersysteem (Dorsale rompmusculatuur / Schoudergordel & bovenarm)
- **Term Latijn:** Musculus latissimus dorsi
- **Term Nederlands:** Brede rugspier
- **Referentiekaart:** Kaart 17 van de set van 50 anatomische flashcards

Visuele oriëntatie

Bekijk het verloop van de vezels vanaf de brede fascia thoracolumbalis en wervelkolom schuin omhoog naar de okselregio en binnenzijde van de bovenarm.

Deze kaart is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

SPIERSYSTEEM / MUSCULATUUR

M. LATISSIMUS DORSI • FUNCTIE & ORIGO

ACHTERZIJDE • ANATOMISCHE DETAILS & FUNCTIE

Gedetailleerde overzichtsgegevens voor actieve herinnering en zelfoverhoring over aanhechtingen, innervatie en biomechanische functies van de musculus latissimus dorsi.

Origo (ourspong):
- Doornuitsteeksels (processus spinosi) van T7–T12, fascia thoracolumbalis, crista iliaca (achterste deel) en onderste 3 tot 4 ribben (vaak ook een slip vanaf de angulus inferior scapulae).

Insertie (aanhechting):
- Crista tuberculi minoris van het opperarmbeen (sulcus intertubercularis humeri).

Innervatie:
- Nervus thoracodorsalis (C6, C7, C8) uit de fasciculus posterior van de plexus brachialis.

Hoofdfuncties schoudergewricht:
- Retroversie (extensie van de geanteflecteerde arm), adductie en endorotatie van de bovenarm.

Hulpfunctie ademhaling:
- Ondersteunt krachtige expiratie en hoesten (compressie van de onderste ribben).

Kleurcodering:
- Magenta banderol (Spiersysteem / Musculatuur).

Klinische & functionele relevantie

Bekend als de 'klimspier': trekt de romp krachtig omhoog wanneer de armen gefixeerd zijn. Bij verlamming van de n. thoracodorsalis is krachtige adductie en het gebruik van krukken ernstig belemmerd.

STUDIE-INSTRUCTIES & ZELFTOETSING

Gebruik deze kaart binnen het Leitner-systeem (spaced repetition) om parate anatomische keniss systematisch te versterken en te testen.

1. **Stap 1:** Bekijk de illustratie op de voorzijde en benoem hardop de origo, insertie, innervatie en hooffuncties.
2. **Stap 2:** Draai de kaart om en controleer elk onderdeel nauwkeurig.
3. **Stap 3:** Sorteer de kaart direct in het juiste herhalingsbakje (elke dag bij fout, elke 3 dagen bij goed, wekelijks bij parate beheersing).

Educatieve disclaimer

Dit materiaal is uitsluitend ontwikkeld voor educatieve doeleinden en anatomische zelfstudie. Het vormt geen medische diagnostiek of behandeladvies.

Printen en snijden

Druk pagina 1 en pagina 2 tweezijdig af op stevig papier (250–300 g/m²) en snijd langs de gestippelde buitenkaders voor het standaard flashcardformaat.

Spaced repetition integratie

Combineer deze kaart met de 49 andere kaarten uit de set en groepeer op kleurcodering (blauw = skelet, magenta = spieren, groen = organen).

Zelfbeoordeling (Datum & Beheersing)

Persoonlijke ezelsbrug / Aantekening

Flashcard 18: Musculus Iliopsoas (Voorzijde & Achterzijde)

MUSCULUS ILIOPSOAS



Voorzijde Flashcard

Bekijk de illustratie aan de voorzijde. Identificeer het verloop van de lumbale wervels en de binnenzijde van het darmbeen naar het bovenbeen alvorens de kaart om te draaien.

SPIERSYSTEEM

MUSCULUS ILIOPSOAS

Spiersysteem • Heupbuigers en Rompstabilisatoren
(Kaart 18 van 50)

- Samengestelde spiergroep: Musculus Psoas Major en Musculus Iliacus
- Gemeenschappelijke aanhechting: Trochanter minor van het femur
- Kleurcodering categorie: Rood / Magenta (Spiersysteem)

Voorzijde Flashcard

Bekijk de illustratie aan de voorzijde. Identificeer het verloop van de lumbale wervels en de binnenzijde van het darmbeen naar het bovenbeen alvorens de kaart om te draaien.

ANATOMISCHE STRUCTUUR EN WERKING

De musculus iliopsoas vormt de krachtigste flexor van het heupgewricht en verbindt de wervelkolom en het bekken direct met het dijbeen.

- **Origo Musculus Psoas Major:** Wervellichamen en processus costales van T12 tot L5 inclusief tussenwervelschijven.
- **Origo Musculus Iliacus:** Binnenzijde van de fossa iliaca en ala ossis ilii.
- **Insertie:** Gezamenlijke pees insererend aan de trochanter minor femoris.
- **Innervatie:** Nervus femoralis (L2-L4) en directe anterieure takken van de plexus lumbalis (L1-L3).
- **Hoofdfuncties:** Heupflexie (knieheffing), anteversie van het bekken en handhaving van lumbale lordose tijdens stand en gang.

Educatieve Disclaimer

Dit leermiddel dient uitsluitend voor educatieve doeleinden en anatomische zelfstudie. Het is geen medisch diagnose- of behandeladvies.

FUNCTIONELE TOEPASSINGEN

1. **Actieve Heupflexie**
   Bij een gefixeerd bekken trekt de iliopsoas het bovenbeen voorwaarts en omhoog, essentieel voor lopen, traplopen en rennen.
2. **Rompflexie en Lumbale Balans**
   Bij een gefixeerd onderlichaam buigt de spier de romp naar voren aanuit liggende positie en balanceert de lumbale lordose in stand.

Dit leermiddel dient uitsluitend voor educatieve doeleinden en anatomische zelfstudie. Het is geen medisch diagnose- of behandeladvies.

MUSCULUS GLUTEUS MAXIMUS



MUSCULUS GLUTEUS MAXIMUS

De grote bilspier (musculus gluteus maximus) is de zwaarste en krachtigste spier van het menselijk lichaam. Hij vormt de oppervlakkige laag van de bilstreek en overspant het heupgewricht posterieur met stevige, schuin verlopende vezelbundels.

- **Lichaamsstelsel:** Spierstelsel (Kleurcodering: Magenta)
- **Origine:** Facies glutea van het os ilium, achterste sacrumoppervlak, os coccygis en ligamentum sacrotuberale.
- **Insertie:** Tuberositas glutea van het femur en de tractus iliotibialis (fascia lata).
- **Innervatie:** Nervus gluteus inferior (L5–S2).

Educatieve Disclaimer
Dit leermiddel is uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden en zelfstudie door studenten en docenten. Het is geen klinische diagnose of behandelrichtlijn.

SPIERSTELSEL • KAART 19/50

FUNCTIONELE EN KLINISCHE TOELICHTING

De musculus gluteus maximus is de primaire krachtige heupextensor. De spier is voornamelijk actief bij dynamische weerstandsbewegingen en niet zozeer tijdens ontspansen vlak lopen.



- **Hoofdfuncties:** Extensie en exorotatie (buitenwaartse draaiing) van het dijbeen in het heupgewricht; bovenste vezels assisteren bij abductie.
- **Bekkenstabilisatie:** Voorkomt anterieure kanteling van het bekken en rompbuiging tijdens rechtopstaande gang, hardlopen en traplopen.
- **Fasciale tractie:** Spant de tractus iliotibialis aan ter stabilisatie van het laterale kniegewricht.
- **Spaced Repetition Tip:** Toets eerst actieve herinnering (anatomische relaties en origines) vóór het omdraaien naar deze toelichting.

STUDIE-AANWIJZING SPIERSTELSEL

Let op het verschil tussen rustig vlak wandelen (waarbij de hamstrings domineren) en opwaartse verplaatsing (zoals traplopen of sprinten), waarbij maximale rekrutering van de gluteus maximus vereist is.

STAP-VOOR-STAP STUDIEAANPAK

1 STAP 1: ACTIEVE RECALL

Bekijk de voorzijde van de kaart en benoem de anatomische grenzen, aanhechtingen en zenuwvoorziening zonder de achterzijde te raadplegen.

2 STAP 2: ZELFCORRECTIE EN SORTEREN

Controleer de achterzijde. Plaats de kaart bij een correct antwoord in de herhaalinval van 3 dagen; bij twijfel of fout in de dagelijkse herhalingsstapel.

Deze kaart is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

MUSCULUS QUADRICEPS FEMORIS



MUSCULUS QUADRICEPS FEMORIS

Vierhoofdige dijbeenspier
(Spiersysteem - Onderste extremiteit)

- M. Rectus femoris (oppervlakkig, bi-articulair)
- M. Vastus lateralis (laterale dijbeenzijde)
- M. Vastus intermedius (diep gelegen onder rectus femoris)
- M. Vastus medialis (mediale dijbeenzijde, druppelvorm distaal)
- Gemeenschappelijke aanhechting: Patellapees (Tendo patellae) via de patella op de tuberositas tibiae

Kleurcodering Spierstelsel

Deze kaart behoort tot de categorie Spierstelsel (Kleurcode: Magenta/Warm Rood). Sorteer uw flashcards op kleur voor gerichte actieve herhaling.

Deze kaart is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden.

KAART 20/50 • SPIERSTELSEL

FLASHCARD ACHTERZIJDE • FYSIOLOGIE & AANHECHTING

FUNCTIONELE EN ANATOMISCHE TOELICHTING

Gedetailleerde overzichtsgegevens voor actieve herinnering en biomechanisch inzicht van de M. quadriceps femoris.

PRIMAIRE BEWEGING:
Krachtige extensie (strekking) van het kniegewricht (articulatio genus).

SECUNDAIRE BEWEGING:
Flexie (buiging) in het heupgewricht (articulatio coxae) uitsluitend door het bi-articulaire verloop van de m. rectus femoris vanaf de spina iliaca anterior inferior.

STABILISATIE & DECELERATIE:
Onmisbare excentrische controle en schokabsorptie bij landen, traplopen en afremmen van voorwaartse loopbewegingen.

INNERVATIE:
Nervus femoralis (spinaal segment L2-L4).

KLINISCHE RELEVANTIE:
Essentieel voor de patellapeesreflex (kniepeesreflex) ter controle van de integriteit van wortel L3-L4.

EDUCATIEVE DISCLAIMER

Dit leermateriaal is uitsluitend bestemd voor anatomische studie en educatieve doeleinden. Het vormt geen medische diagnose of therapeutisch advies.

ISCHIOCRURALE SPIEREN (HAMSTRINGS)

SPIERSTELSEL

Flashcard 21 • Dorsale dijbeengroep (Spiersysteem / Musculair)

- Caput longum m. bicipitis femoris
- Caput breve m. bicipitis femoris
- Musculus semitendinosus
- Musculus semimembranosus



Achteraanzicht (dorsaal)

Kleurcodering Spiersysteem
Rode kleurmarkering: Deze kaart behoort tot het musculaire stelsel van de onderstre extremiteit.

ANATOMIE EN FUNCTIE

De ischiocrurale spieren overspannen sowel het heup- als het kniegewricht (met uitzondering van het caput breve) en vormen de primaire buigers van het onderbeen.

Origo: Tuber ischiadicum van het bekken (gezamenlijke oorsprong van caput longum, semitendinosus en semimembranosus); linea aspera op het femur (caput breve).

Insertie: Caput fibulae (m. biceps femoris); mediale zijde proximale tibia via pes anserinus superficialis (m. semitendinosus); mediale condyl van de tibia via diepe peesaanhechting (m. semimembranosus).

Functie: Retroflexie (extensie) in het heupgewricht, flexie in het kniegewricht en endo-/exorotatie van het gebogen onderbeen.

Innervatie: Nervus ischiadicus (nervus tibialis voor mediale groep en lange kop; nervus fibularis communis voor korte kop).

Klinische Relevantie: Hamstringletsel
Verrekkingen en avulsies treden frequent op bij explosieve sprints of trapbewegingen (overmatige excentrische belasting tijdens de late zwaaifase).

STUDIE- EN CONTROLEVRAGEN

Toets uw kennis van de dorsale dijbeenspieren aan de hand van onderstaande herhalingsvragen:

1. Welke specifieke spierkop ontspringt niet aan het tuber ischiadicum maar aan de linea aspera?
2. Welke drie spierpezen vormen samen de pes anserinus superficialis aan de mediale proximale tibia?
3. Welke tak van de n. ischiadicus innerveert het caput breve van da m. biceps femoris?

Disclaimer Educatief Gebruik
Dit leermiddel is uitsluitend bestemd voor anatomische studie en algemeen vormend onderwijs. Het bevat geen medisch advies, behandelplan of klinische diagnostiek.

M. GASTROCNEMIUS

SPIERSTELSEL



STRUCTUUR EN NAAMGEVING

Musculus gastrocnemius (tweekoppige kuitspier). Onderdeel van het spierstelsel van het onderbeen.

- Caput mediale: oorsprong aan de mediale femurcondylus (bovenzijde achterzijde dijbeen).
- Caput laterale: oorsprong aan de laterale femurcondylus.
- Insertie: distale samenvloeiing met de musculus soleus in de tendo calcaneus (achillespees), aanhechtend op het tuber calcanei (hielbeen).

Educatieve Disclaimer

Dit materiaal is uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden en studieondersteuning. Het vormt geen medisch advies, klinische diagnose of behandelrichtlijn.

FYSIOLOGIE EN FUNCTIE

De **musculus gastrocnemius** overspant twee gewrichten (bi-articulair: knie en enkel) en vervult zowel mechanische als **hemodynamische basisfuncties.**

- **Plantairflexie:** krachtige neerwaartse buiging van de voet in het bovenste spronggewricht (essentieel bij afzet tijdens hardlopen en springen).
- **Knieflexie:** ondersteunt de buiging van het onderbeen in het kniegewricht.
- **Spierpomp:** ritmische contractie comprimeert de diepe venen van het onderbeen en bevordert de veneuze terugvloeiing van bloed richting het hart tegen de zwaartekracht in.

MUSCULUS GASTROCNEMIUS



KNIEFLEXIE



buiging in het kniegewricht

PLANTAIRFLEXIE

neerwaartse buiging in het spronggewricht

SPIERPOMP



Studietip: Dubbele Werking

Omdat de gastrocnemius over het kniegewricht én het spronggewricht loopt, is de plantairflexiekracht maximaal wanneer de knie gestrekt is.

Deze flashcard is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

MIDDENRIF (DIAPHRAGMA)

— VOORZIJDE

Flashcard #23 — Voorzijde: Diaphragma

Systeem: Musculair & Respiratoir steslel (Kleurcode: Karmijnrood / Spierstelsel)

Structuurnaam: Diaphragma (Middenrif)

Primaire ademhalingsspier die de borstholte (cavitas thoracis) scheidt van de buikholte (cavitas abdominis).

VISUEEL LEERANKER

Koepelvormige spier-peesplaat met dubbele koepel (rechterkoepel staat fysiologisch iets hoger dan de linkerkeepel door de ligging van de lever).

KERNPUNTEN

- **Centrum tendineum:** centrale peesplaat waar de spiervezels radiaal samenkomen
- **Pars sternalis:** aanhechting aan de binnenzijde van de processus xiphoideus
- **Pars costalis:** binnenzijde van ribkraakbeenderen en onderste ses ribben (ribben 7 t/m 12)
- **Pars lumbalis:** oorsprong uit lumbale wervellichamen (L1-L3 via crus dextrum en crus sinistrum) en ligamenta arcuata
- Drie grote diafragmatische openingen voor vitale structuren



DOORGANGEN & HOOGTENIVEAUS

Het diafragma bevat drie belangrijke doorboringen waardoor grote vaten, zenuwen en de spijsverteringsbuis van thorax naar abdomen lopen:

- **Foramen venae cavae (Th8):** Doorgang in het centrum tendineum voor de vena cava inferior en takken van de rechter nervus phrenicus. Rekt open bij contractie voor bevordering van veneuze terugvloed.
- **Hiatus oesophageus (Th10):** Ovale spieropening gevormd door lussen van het crus dextrum; geleidt de oesophagus, truncus vagalis anterior en truncus vagalis posterior.
- **Hiatus aorticus (Th12):** Peesachtige opening achter het ligamentum arcuatum medianum (vrij van spiercontractiedruk): geleidt de aorta descendens, ductus thoracicus en vena azygos.

Ezelsbruggetje niveaus

V-O-A op 8, 10, 12:
Vena Cava (8 letters: Th8),
Oesophagus (10 letters: Th10),
Aorta (Aortic Hiatus = 12 letters: Th12).

— Deze informatie is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden —

Flashcard #23 — Achterzijde: Functie, Innervatie & Repetitie

MUSCULAIR / RESPIRATOIR

MIDDENRIF (DIAPHRAGMA) — ACHTERZIJDE

Functionele anatomie, bezenuwing en mechanica van thoraxexpansie:

- **Motorische innervatie:**
  Uitsluliend de nervus phrenicus (bilateraal: C3, C4, C5; leidende vuistregel: 'C3, 4, 5 keep the diaphrapm alive').
- **Sensorische innervatie:**
  Nervus phrenicus verzorgt de centrale pees en pleura/peritoneum; perifere intercostale en subcostale zenuwen (Th5-Th12) verzorgen de perifere spierranden.
- **Inspiratiemechanica:**
  Bij contractie vlakken de koepels af en daalt het centrum tendineum. Dit vergroot de verticale diameter van de thoraxholte.
- **Drukverandering:**
  Intrathoracale druk daalt onder atmosferische druk (negatieve druk), waardoor lucht passief de longen instroomt; tegelijkertijf stijgt de intra-abdominale druk.
- **Expiratiemechanica:**
  Rustige uitademing verloopt passief via elastische retractie van het longweefsel en ontspanning van het diafragma.



Educatieve Disclaimer
Dit materiaal is uitsluitend bestemd voor anatomisch onderwijs en zelfstudie. Het vormt geen medische diagnose, behandelplan of klinisch voorschrift.

ACTIEVE HERHALING & ZELFTOETSING

Gebruik het Spaced Repetition-principe (Leitner-box of 1-3-7 dagen interval). Toets jezelf op de onderstaande anatomische kernvagen alvorens de kaart om et draaien.

1. **Stap 1: Doorgangsniveaus neemen**
   Noem uit het hoofd de wervelniveaus van het foramen venae cavae, de hiatus oesophageus en de hiatus aorticus incluseif de doorkruisende structuren.
2. **Stap 2: Innervatieroutes verifiëren**
   Verklaar de spinale oorsprong van de nervus phrenicus en leg uit waarom letsel boven C3 leidt tot diafragmaparalyse.
3. **Stap 3: Druk- en volumeverandering schetsen**
   Beschrijf de relatie tussen koepeldaling, volume-uitzetting van de thorax en drukverlaging in de pleuraholte tijdens actieve inademing.

Notities actieve reproductie & controlepunt doorgangen

Herhalingsdatum (Box 1 / Box 2 / Box 3) & score

Kon je alle drie de doorgangen (Th8, Th10, Th12) en de innervatiewortels (C3-C5) foutloos reproduceren?

- Ja, vlekkeloos en zonder twijfiel gereproduceerd.
  → Plaats flashcard #23 in Box 2 (herhaling over 3 tot 5 dagen).
- Nee, wervelniveau of zenuwvertakking verwisseld.
  → Houd flashcard #23 in Box 1 (dagelijkse actieve herhaling tot consolidatie).

Educatieve Disclaimer
Dit materiaal is uitsluitend bestemd voor anatomisch onderwijs en zelfstudie. Het vormt geen medische diagnose, behandelplan of klinisch voorschrift.

MUSCULUS MASSETER

SPIERSTELSEL
KLEURCODE:
KARMOZIJNROOD /
SPIERROOD



MUSCULUS MASSETER (VOORZIJDE)

Kauwspier: Musculus masseter (oppervlakkig en diep deel).
Lichaamssysteem: Spierstelsel (Kauwapparaat).
Identificatiecode: MC-024.

- **Systeemclassificatie:** Spierstelsel (Kleurcode: Karmozijnrood / Spierrood)
- **Topografische regio:** Laterale aangezichtszijde, over het ramus mandibulae
- **Belangrijkste herkenningspunt:** Krachtige rechthoekige contour van de wang

EDUCATIEVE DISCLAIMER
Dit material is uitsluitend bestemd voor anatomische studie en educatieve doeleinden. Het vormt geen medische diagnose of behandeladvies.

M. MASSETER: DETAILS

SPIERSTELSEL

FUNCTIONELE EN ANATOMISCHE SPECIFICATIES (ACHTERZIJDE)

Gedetailleerde overzichtskaart van de origo, insertie, biomechanische functies, innervatie en klinische relevantie van de musculus masseter.

- **Origo:** Arcus zygomaticus (jukboog) en het aangrenzende os zygomaticum.
- **Insertie:** Tuberositas masseterica op de angulus mandibulae en het laterale oppervlak van de ramus mandibulae.
- **Primaire functies:** Krachtige elevatie van de mandibula (sluiten van de kaken); de oppervlakkige vezels dragen bij aan protrusie (naar voren schuiven).
- **Innervatie:** Nervus massetericus, een tak van de nervus mandibularis (N. V3, derde hoofdtak van de nervus trigeminus).
- **Klinische correlatie:** Hypertrofie en overbelasting bij bruxisme (tandenknarsen en klemmen) en temporomandibulaire dysfunctie (TMD).



STUDIEMETHODE SPACED REPETITION

Test actieve herinnering: noem eerst origo, insertie en innervatie voordat u de kaart omdraait. Sorteer op beheerste versus te herhalen kaarten.

✓ ENKEL VOOR EDUCATIEVE DOELEINDEN – GEEN MEDISCH ADVIES ✓

MUSCULUS TRAPEZIUS

SPIERSTELSEL | KAART 25/50



M. Trapezius — Voorzijde
(Illustratie & Nomenclatuur)

MUSCULUS TRAPEZIUS (MONNIKSKAPSPIER)

Flashcard Voorzijde — Spierstelsel. Grote oppervlakkige ruitvormige spier van de bovenrug en nekregio. Drie functionele componenten: pars descendens (bovenzijde), pars transversa (midden), en pars ascendens (onderzijde).

- **Systeem:** Musculair stelsel (Kleurcode: Karmozijnrood / Spiergroep)
- **Pars descendens:** van linea nuchalis superior en protuberantia occipitalis externa naar lateraal clavicula
- **Pars transversa:** van processus spinosi C7-Th3 naar acromion en spina scapulae
- **Pars ascendens:** van processus spinosi Th4-Th12 naar trigonum spinae scapulae
- **Kleurcodering:** Spierstelsel (Rood / Karmijn)

Educatieve Disclaimer & Snij-instructie
Uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden; niet bedoeld voor medische diagnoses of behandelplannen. Knip langs de gestreepte buitenkaderlijnen voor een standaard flashcard-formaat van 85 x 125 mm.

M. TRAPEZIUS — ACHTERZIJDE (FUNCTIE & INNERVATIE)

FUNCTIONELE ANATOMIE & INNERVATIE

Flashcard Achterzijde — Gedetailleerde functionele toelichting, scapulamobiliteit en klinisch-fysiologische correlatie.



- **Pars descendens:** elevatie (optrekken) en craniale rotatie van het schouderblad (scapula); draagt bij aan nekextensie bij bilaterale contractie.
- **Pars transversa:** retractie (adductie) van de scapula naar de wervelkolom toe.
- **Pars ascendens:** depressie (omlaag trekken) en mediale rotatiebegeleiding van het schouderblad.
- **Schoudergordelfixatie:** synergistische stabilisatie van de scapula tegen de thoraxwand tijdens bovenhandse armbewegingen.
- **Motorische innervatie:** Nervus accessorius (Hersenzenuw XI / N. cranialis XI).
- **Sensibele/proprioceptieve bezenuwing:** plexus cervicalis (spinale takken C3-C4).
- **Klinisch overbelastingspatroon:** myogene triggerpoints in pars descendens veroorzaken vaak spanningshoofdpijn ('cervicogene hoofdpijn') en uitstralende stijfheid langs de nek-schouderovergang bij langdurig statische zithoudingen.

WERKING OP DE SCAPULA



(optrekken) (adductie) (omlaag trekken)

MOTORISCHE INNERVATIE (N. ACCESSORIUS XI)



- Motorische innervatie: Nervus accessorius (Hersenzenuw XI / N. cranialis XI).
- **Sensibele/proprioceptieve bezenuwing:** plexus cervicalis (spinale takken C3-C4).

KLINISCHE OVERBELASTING

- Myogene triggerpoints in pars descendens veroozzaken vaak spanningshoofdpijn ('cervicogene hoofdpijn') en uitstralende stijfheid langs de nek-schouderovergang bij langdurig statische zithoudingen.

Studeertip Spaced Repetition

Test actieve herinnering: bedek de achterzijde, benoem de drie spiergedeelten op de voorzijde en reproduceer de motorische innervatie (hersenzenuw XI) alvorens te controleren.

Deze flashcard is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden.

COR (HART)



COR — ANATOMISCHE COMPARTIMENTEN & KLEPPEN

Cardiovasculair steslsel (Orgaancompartiment). Deze flashcard toont de interne architectuur van het menselijk hart (cor): atria, ventrikels, atrioventriculaire en halvemaanvormige kleppen, en het musculaire myocardium.

- Atrium dextrum (rechterboezem) & Atrium sinistrum (linkerboezem)
- Ventriculus dexter (rechterkamer) & Ventriculus sinister (linkerkamer)
- Valva tricuspidalis & Valva bicuspidalis (mitralisklep)
- Valva trunci pulmonalis & Valva aortae (semilunaire kleppen)
- Septum interventriculare en Myocardium (gespierde wand)

Studie-instructie Voorzijde TIP

Benoem eerst blindelings de vier compartimenten en vier kleppen aan de hand van de contourlijnen voordat je de kaart omdraait.

Voor educatieve doeleinden. Niet gebruiken als medisch advies.

COR — FYSIOLOGIE, CIRCULATIE EN GELEIDING

Functionele toelichting bij de bloedsomloop, cardiale prikkelgeleiding en mechanische contractiecycli.

- **Kleine bloedsomloop (pulmonaal):** Vena cava -> Atrium dextrum -> Valva tricuspidalis -> Ventriculus dexter -> Valva trunci pulmonalis -> Truncus pulmonalis richting de longen voor oxygenatie.
- **Grote bloedsomloop (systemisch):** Longvenen -> Atrium sinistrum -> Valva mitralis -> Ventriculus sinister -> Valva aortae -> Aorta naar de perifere weefsels.
- **Prikkelgeleiding:** Autonome depolarisatie initieert in de Nodus sinuatrialis (sinusknoop, 60-100/min), vertraagt kort in de Nodus atrioventricularis (AV-knoop), loopt door de Bundel van His, linker- en rechter bundeltakken en Purkinje-vezels.
- **Pompmechanica:** Systole (isovolumetrische contractie en ejectie) afgewisseld met Diastole (isovolumetrische relaxatie en ventriculaire vulling).

KLEINE BLOEDSOMLOOP (PULMONAAL)



GROTE BLOEDSOMLOOP (SYSTEMISCH)



PRIKKELGELEIDING



MECHANISCHE HARTCYCLUS



Disclaimer Educatief Gebruik
Uitsluliend bestemd voor anatomisch en fysiologisch onderwijs.
Niet bedoeld als medische diagnose of behandeladviss.

AORTA



AORTA EN HOOFDVERTAKKINGEN (SYSTEMISCHE ARTERIËLE HOOFDSTAM)

Cardiovasculair stelsel • Flashcard u27 (Voorzijde: Structuuridentificatie)

- Aorta ascendens (stijgende aorta)
- Arcus aortae (aortaboog)
- Truncus brachiocephalicus
- Arteria carotis communis sinistra
- Arteria subclavia sinistra
- Aorta thoracica (dalende borstaorta)
- Aorta abdominalis (buikaorta)
- Bifurcatio aortae (splitsing in arteriae iliacae communes)

Zelfoverhoring

Benoem de drie grote vaten die direct ontspringen uit de arcus aortae van rechts naar links voordat je de kaart omdraait.

Deze kaart is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

FLASHCARD ACHTERZIJDE: FUNCTIE EN VERTAKKINGEN

FYSIOLOGIE, VERTAKKINGEN EN FUNCTIE (ACHTERZIJDE)

De aorta vormt het primaire hogedrukvat van de grote bloedsomloop en transporteert zuurstofrijk bloed vanuit de linker ventrikel naar de perifere weefsels.





Elastische vezels in de tunica media zorgen voor demping van de drukgolf en een continue bloedstroom.

- **Elastische compliantie (Windketelfunctie):**
  Demping van de systolische drukgolf door elastische vezels in de tunica media en instandhouding van een continue diastolische bloedstroom.

- **Arcus-vertakkingen:**
  Truncus brachiocephalicus (vertakt in a. carotis communis dextra en a. subclavia dextra), a. carotis communis sinistra, en a. subclavia sinistra naar hoofd, hals en bovenste ledematen.

- **Thoracale pariëtale en viscerale takken:**
  Arteriae intercostales posteriores, bronchiale en oesofageale arteriën.

- **Abdominale viscerale takken:**
  Truncus coeliacus (ongepaard: maag, lever, milt), a. mesenterica superior (dunne darm, proximale colon), aa. renales (gepaard: nieren), a. mesenterica inferior (distale colon, rectum).

- **Terminatie:**
  Bifurcatio aortae ter hoogte van wervel L4 in de arteriae iliacae communes sinistra en dextra voor bekken en benen.



EDUCATIEVE DISCLAIMER

Dit materiaal dient uitsluitend voor anatomische studie en educatieve doeleinden. Het vormt geen medisch advies, klinische diagnose of behandelrichtlijn.

1 STAP 1: ACTIEVE HERINNERING

Bekijk de voorzijde van de kaart en visualiseer het volledige traject van aortaklep tot bifurcatie zonder de tekst te raadplegen.

2 STAP 2: SEGMENTALE TRACERING

Loop de viscerale aftakkingen van de buikaorta van craniaal naar caudaal na en noem hun doelorgaan.

3 STAP 3: SPACED REPETITION RUBRICERING

Sorteer de kaart in de herhalingsbak op basis van beheersing: herhaal binnen 24 uur bij aarzeling, of verplaats naar wekelijkse herhaling bij foutloze reproductie.

VENA CAVA



VENA CAVA SUPERIOR & INFERIOR

Cardiovasculair Stelsel • Grote Veneuze Verzamelvaten

- Vena Cava Superior (Bovenste Holle Ader): brengt zuurstofarm bloed terug naar het hart vanuit het hoofd, de hals, de bovenste ledematen en de thoraxwand.
- Vena Cava Inferior (Onderste Holle Ader): grootste veneuze stam van het lichaam; verzamelt bloed vanuit het onderlichaam, bekken en buikorganen.
- Gemeenschappelijke bestemming: monden beide rechtstreeks uit in het rechteratrium (rechterboezem) van het hart.

Educatieve Disclaimer

Dit leermiddel dient uitsiluitend voor anatomische en fysiologische educatie. Het is geen klinisch diagnostisch instrument of medisch behandeladvies.

KAARTACHTERZIJDE: FUNCTIE EN DRAINAGEGEBIEDEN

FUNCTIONELE EN ANATOMISCHE TOELICHTING

Veneuze terugkeer en hemodynamische karakteristieken van de holle aderen.

- **Vena Cava Superior:** gevormd door de samenvloeiing van de linker en rechter vena brachiocephalica; loopt retrosternaal in het mediastinum superius en ontbeert functionele veneuze kleppen.
- **Vena Cava Inferior:** ontstaat ter hoogte van wervel L5 door de vereniging van de venae iliacae communes; loopt rechts van de abdominale aorta door het foramen venae cavae van het diafragma (T8).
- **Hemodynamiek:** veneuze stroom verloopt onder lage druk en is afhanhelijk van de intrathoracale drukveranderingen (ademhalingspomp), spierpompwerking en de arteriële pulsaties.
- **Zijtakken VCI:** ontvangt onder meer de venae renales, hepaticae, lumbales en phrenicae inferiores (het bloed uit het maag-darmkanaal passeert eerst de vena portae hepatis).



ZELFOVERHORING & HERHALING

Test je kennis actief: noem het drainagegebied van beide stammen en benoem het diafragmaniveau van doorgang voor de VCI voordat je de kaart omdraait.

1 Identificeer de instroomopeningen

Lokaliseer de aanhechting van de VCS bovenin het rechteratrium en de VCI aan de postero-inferieure zijde.

2 Bepaal de stroomrichting en kleploze aard

Controleer dat de grote centrale holle aderen geen kleppen bevatten die retrograde drukveranderingen verhinderen.

Deze kaart is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

TRACHEA EN BRONCHUSBOOM

TRACHEA EN BRONCHUSBOOM

Card #29 • Ademhalingssteslel (Systeemplaat Cyaan)

- Trachea (Luchtpijp) met C-vormige kraakbeenringen
- Carina tracheae (Bifurcatiekam)
- Bronchus principalis dexter et sinsister (Hoofdbronchi)
- Bronchi lobares (Kwabbronchi: 3 rechts, 2 links)

Studie-instructie Voorzijde

Benoem eerst zelfstandig de aangeduide vertakkingen en kraakbeenstructuren alvorens de kaart om te draaien.



Deze kaart is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

FLASHCARD #29 ACHTERZIJDE: FUNCTIE EN SPECIFICATIES

FUNCTIONELE EN ANATOMISCHE TOELICHTING

Overzicht van de functionele rol, histologische eisenschpapen en ventilatiedynamiek van de lagere luchtwegen.

- **Kraakbeenringen:** 16 tot 20 hoefijzervormige ringen van hyalien kraakbeen houden het lumen continu doorgankelijk onder intrathoracale drukverschillen. Aan de dorsale zijde bevindt zich de musculus trachealis, grenzend aan de oesofagus.
- **Mucociliaire klaring:** Trilhaarepitheel (pseudogelaagd cilindrisch trilhaarepitheel) bekleed met slijmbekercellen transporteert geïnhaleerde partikels en micro-organismen craniaalwaarts richting de farynx (de mucus-roltrap).
- **Vertakkingsasymmetrie:** De rechter hoofdbronchus verloopt steiler, wijder en korter dan de linker hoofdbronchus, wat klinisch verklaart waarron aspiratiecorpora vaker in de rechterlong terechtkomen.
- **Anatomische dode ruimte (VD):** Het volume van de luchtgeleidende zone (circa 150 ml) waar wel luchtstroming plaatsvindt, maar geen directe alveolaire gaswisseling.



Vergroot aanzicht (schematisch)

KLINISCHE & FYSIOLOGISCHE AANTEKENING

De carina is dicht geïnnerveerd door sensibele zenuwvezels; mechanische prikkeling triggert een karcktige hoestreflex om de lagere luchtwegen te beschermen.



STAPPEN

1 Stap 1: Luchtgeleiding en conditionering

Ingeademde lucht stroomt door de trachea, waar opwarming en verzadiging met waterdamp continueren.

2 Stap 2: Bifurcatie en stroomverdeling

Bij de carina splitst de hoofdstroom zich asymmetrisch over de linker en rechter bronchus principalis richting respecteivelijk 2 en 3 secundaire lobaire bronchi.

STUDIE- EN GEBRUIKSINSTRUCTIE

Praktische handreiking voor assemblage en integratie binnen spaced repetition.

- Afdrukken op stevig papier (250–300 g/m²) voor langdurig studiegemak.
- Snijd langs de buitenste snijlijnen om een uniforme kaartafmeting binnen het deck van 50 eenheden te garanderen.
- Kleurmarkering cyaan sorteert direct in het deelsysteem Ademhalingsstelsel.

EDUCATIEVE DISCLAIMER

Dit leermiddel is uitsluitend ontwikkeld voor educatieve en anatomische studiedaeleinden en vormt geen medische diagnose of behandelrichtlijn.

Dit leermiddel is uitsluitend ontwikkeld voor educatieve en anatomische studiedoeleinden en vormt geen medische diagnose of behandelrichtlijn.

FLASHCARD VOORZIJDE — PULMONES & RESPIRATOIR MEMBRAAN

LONGEN (PULMONES) & RESPIRATOIR MEMBRAAN

Anatomische flashcard voorzijde: Respiratoir Stelsel — Visueel overzicht van de macroscopische longstructuur en microscopische functionele gaswisselingseenheid.

- Pulmo dexter: 3 kwabben (lobi superior, medius, inferior) gescheiden door fissura horizontalis en fissura obliqua
- Pulmo sinister: 2 kwabben (lobi superior en inferior) gescheiden door de fissura obliqua, met incisura cardiaca
- Respiratoir membraan: alveolair epitheel (type I pneumocyten), gefuseerde basale membraan en capillair endotheel
- Alveolaire celpopulatie: type II pneumocyten (productie van longsurfactant) en alveolaire macrofagen





Systeemclassificatie
Orgaanstelsel: Respiratoir stelsel (Kleurcodering: Hemelsblauw/Cyaan).
Snijd langs de gestippelde buitenkader voor flashcard-formaat.

— Deze flashcard is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden. —

FYSIOLOGIE: DIFFUSIE & PLEURADRUK

RESPIRATOIR STELSEL • KAART 30/50

FYSIOLOGIE: DIFFUSIE, DRUKDYNAMIEK & SURFACTANT

Functionele flashcard achterzijde: Toelichting op de biofysische mechanismen van ventilatie en respiratoire uitwissieling.

- **Passieve diffusie:** Gedreven door partiële drukgradiënten (Wet van Fick). Zuurstof diffundeert van alveolus (pO2 ~100 mmHg) naar capillair (pO2 ~40 mmHg); CO2 diffundeert omgekeerd (pCO2 van ~45 naar ~40 mmHg).
- **Surfactantwerking:** Mengsel van fosfolipiden en eiwitten geproduceerd door type II alveolaircellen verlaagt de oppervlaktespanning en voorkomt collaps (atelectase) van kleine alveoli volgens de wet van Laplace.
- **Pleuradrukken & Mechanica:** De intrapleurale druk blijft subatmosferisch (-4 tot -7 mmHg ten opzichte van intrapulmonale druk) en waarborgt elastische adhesie tussen pleura visceralis en parietalis.
- **Studiemethode:** Spaced repetition — test actieve herinnering van de fissuren en diffusiegradiënten alvorens de kaart om te draaien.

PLEURADRUK & DRUKDYNAMIEK



Intrapleurale druk blijft subatmosferisch (-4 tot -7 mmHg) ten opzichte van intrapulmonale druk.

PARTIËLE DRUKGRADIËNTEN



Diffusie door partiële drukgradiënten: O2 van alveolus naar capillair, CO2 omgekeerd.

ALVEOLAIRE OPPERVLAKTESPANNING



Hoge oppervlaktespanning → risico op collaps (atelectase).

Verlaagde oppervlaktespanning → stabiliseert alvvoli en voorkomt collaps.

Surfactant (fosfolipiden + eiwitten) verlaagt de oppervlaktespanning volgens de wet van Laplace.

EDUCATIEVE DISCLAIMER

Uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden ten behoeve van anatomie- en fysiologiestudie. Vormt geen medische diagnostiek of behandelrichtlijn.

3 mm

OESOPHAGUS

ORGAANSTELSEL • 31/50



SLOKDARM (OESOPHAGUS)

Systeem: Spijsverteringsstelsel (Orgaan) | Kaartnummer: 31/50

Visueel overzicht van het anatomische traject van de oesophagus, beginnend ter hoogte van de pharynx (C6), afdalend door het mediastinum posterius van de thoraxholte, direct dorsaal van de trachea en het hart, en passerend door het hiatus oesophageus van het diafragma (Th10) naar de maagcardia (Th11).

- **Pars cervicalis:** proximaal traject vanaf de cartilago cricoidea langs de trachea.
- **Pars thoracica:** mediaan traject door het achterste mediastinum.
- **Pars abdominalis:** kort intra-abdominaal segment na doorgang door het diafragma.

Kleurcodering Orgaanstelsels

Oranje kleurmarkering (Spijsverteringsstelsel & Viscera).
Raadpleeg de indexkaart voor skelet- en spierstelselgroeperingen.

Deze kaart is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden.

FYSIOLOGIE & OVERGANGEN

OVERGANG MUSCULARIS EXTERNA



ONDERSTE OESOFAGUSSPHINCTER (LES)



STRUCTUUR & FUNCTIONELE FYSIOLOGIE

De oesophagus is een gespierde buis van circa 25 cm die voedselbolussen transporteert via gecoördineerde peristaltische contractiegolven. De wandopbouw vertoont een unieke overgang in spierweefsel en functionele sfincters.

- Spierweefselovergang in de tunica muscularis: Proximaal 1/3 bestaat uit willekeurig dwarsgestreept spierweefsel; mediaal 1/3 toont een geleidelijke mengeling; distaal 1/3 bestaat volledig uit autonoom glad spierweefsel.
- Bovenste oesofagussfincter (UES / m. cricopharyngeus): Voorkomt luchtinwaarts transport tijdens ventilatie en aspireert bescherming.
- Onderste oesofagussfincter (LES): Fysiologische hogedrukzone bij de gastro-oesofageale overgang, versterkt door de crus dextrum van het diafragma om zure maagreflux te blokkeren.
- Peristaltiek: Primaire peristaltische golf geïnitieerd door slikreflex; secundaire peristaltiek bij residuele distensie via het plexus myentericus (Auerbach).

Educatieve Disclaimer

Uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden en anatomische zelfstudie; niet geschikt voor medische diagnostiek of therapeutische besluitworming.

ACTIEVE HERHALING & KENNISCHECK

Controleer uw begrip van de fysiologische overgangszones en sfinctermechanismen van de oesophagus alvorens deze kaart te verplaatsen in uw Leitner-studeerbox.

- Welk wervelinveau markeert het begin (cartilago cricoidea) en welk niveau de hiatus oesophageus?
- Welke autonome zenuw verzorgt de voornaamste parasympathische innervatie van de oesofagus?
- Hoe verschilt de weefsellaag van de buitenwand van de slokdarm (adventitia) van die van de maag (serosa)?

Zelfbeoordeling Spaced Repetition (Interval 1d / 3d / 7d / 14d)

Aantekeningen klinische relatie (bijv. reflux, achalasie)

Educatieve Disclaimer

Uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden en anatomische zelfstudie; niet geschikt voor medische diagnostiek of therapeutische besluitworming.

MAAG
(GASTER / VENTRICULUS)



ANATOMISCHE REGIO'S VAN DE MAAG:

Cardia (maagmond), Fundus gastricus, Corpus gastricum (maaglichaam), Antrum pyloricum en Pylorus (maagportier met sfincter).

- **Cardia:** instroomgebied direct distaal van de gastro-oesofageale overgang
- **Fundus:** koepelvormig reservoir craniaal van het niveau van de cardia
- **Corpus:** centraal en grootste segment van de maag
- **Antrum pyloricum:** distaal trechtervormig meng- en maalcompartiment
- **Pylorus:** sluitspierkanaal dat de passage naar het duodenum reguleert

KLEURCODERING ORGAANSTELSEL

Spijsverteringsstelslel (oranje). Deze kaart maakt deel uit van de 50-delige flashcardset.

Dit kaartje is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden.

FLASHCARD ACHTERZIJDE: MAAG FYSIOLOGIE & FUNCTIE

FYSIOLOGIE EN FUNCTIE

De maag vervult zowel mechanische als biochemische functies in de spijsvertering en produceert essentiële factoren voor opname.

1 ZOUTZUURPRODUCTIE (HCl)

- geprodouceerd door pariëtale cellen;
- verlaagst pH tot 1,5–2,0 ter denaturatie van eiwitten en pathogeneneliminatie



2 PEPSINE-ACTIVATIE

- hoofdcellen secerneren pepsinogeen, dat bij lage pH wordt geactiveerd tot actief pepsine voor eiwitsplitsing



3 SLIJMVLIESBARRIÈRE

- mucus en bicarbonaat geprodouzered door foveolaire cellen beschermen de maagwand tegen zelfvertering



4 CHYMUSMENGING

- kracktèige contractiegolven van de drielaagse muscularis vermalen voedsel-brokken tot een vloeibare brij



5 INTRINSIEKE FACTOR (IF)

- afgescheiden door pariëtale cellen;
- noodezakkijk voor de latere resorptie van vitamine B12 in het terminale ileum



EDUCATIEVE DISCLAIMER

Uitsluitiend bestemd voor educativve doeleinden.
Geen diagnostisch of klinisch behandeladvies.

Flashcard 33 — Voorzijde: Hepar Anatomie

LEVER (HEPAR)

ANATOMIE & KWABBEN

Flashcard Voorzijde: Topografische anatomie van de lever met aanduiding van de vier anatomische kwabben en de vasculaire toevoer via de poortadercirculatie.



LEVER (HEPAR) — ANATOMIE & KWABBEN

- **Lobus dexter:** De omvangrijke rechterkwab, gesitueerd aan de rechterzijde van het ligamentum falciforme.
- **Lobus sinister:** De plattere linkerkwab, gelegen links van het ligamentum falciforme.
- **Lobus caudatus:** De dorsaal gesitueerde kwab, anatomisch begrensd door de vena cava inferior en de fissura ligamenti venosi.
- **Lobus quadratus:** De ventraal-inferieur gelegen rechthoekige kwab, gesitueerd tussen de vesica biliaris (galblaas) en de fissura ligamenti teretis.
- **Vena portae hepatis:** Vervoert voedingsstofrijk, zuurstofarm veneus bloed afkomstig uit het maag-darmkanaal en de milt rechtstreeks naar het leversinusoidensysteem.
- **Arteria hepatica propria:** Voorziet het leverparenchym van zuurstofrijk arterieel bloed.

Educatieve Toelichting & Portale Triade

Bij de porta hepatis treden drie vitale structuren binnen of buiten: de vena portae hepatis, arteria hepatica propria en ductus hepaticus communis (de klaxsieke portale triade van Glisson).

Dit materiaal is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden.

LOBULAIRE ARCHITECTUUR & FYSIOLOGISCHE FUNCTIES

Flashcard Achterzijde: Microscopische opbouw en de vier primaire metabole en fysiologische pijlers van hepatocyten.

- **Lobulaire Architectuur**: Hexagonale klassiede leverlobuli met centraal de vena centralis en op de hoekpunten de portale triades (Glisson-triade). Bloed stroomt vanuit de triade via sinusoïden naar de centrale vene; gal stroomt tegengesteld via canaliculi naar de galgangen.
- **Metabole Omzetting**: Regulatie van het lipidemetabolisme (synthese van lipoproteïnen, cholesterol, triglyceriden), eiwitsynthese (o.a. albumine, fibrinogeen, stollingsfactoren) en aminozuurmetabolisme (deaminering en vorming van ureum).
- **Galproductie**: Hepatocyten produceren galzouten, bilirubine en fosfolipiden ter emulsificatie en verteting van vetten in het duodenum.
- **Ontgifting & Biotransformatie**: Fase I- en Fase II-biotransformatie van toxines, farmaca, alcohol en endogene metabolieten via cytochroom P450-enzymsystemen in het glad endoplasmatisch reticulum.
- **Glycogeenopslag & Homeostase**: Handhaving van de bloedglucoseplasmaspiegels door glycogeensynthese (glycogenese) onder invloed van insuline en glycogeenafbraak (glycogenolyse) / nieuwvorming (gluconeogenese) onder invloed van glucagon.

Portale triade (Glisson-triade)
- Arteria hepatica
- Vena portae
- Galgang

Sinusoïden

Kupffer-cel

Hepatocyten

Celsstrengen



Bloedstroom naar vena centralis

Galstroom naar galgangen

METABOLE OMZETTING
- **Lipidenmetabolisme** (lipoproteïnen, cholesterol, triglyceriden)
- **Eiwitsynthese** (albumine, fibrinogeen, stollingsfactoren)
- **Aminozuurmetabolisme** (deaminering, ureum)

GALPRODUCTIE
- Galzouten
- Bilirubine
- Fosfolipiden

(emulsificatie en vertering van vetten in het duodenum)

ONTGIFTING & BIOTRANSFORMATIE
- Fase I- en Fase II-biotransformatie
- Cytochroom P450-enzymsystemen
- Glad endoplasmatisch reticulum

GLYCOGEENOPSLAG & HOMEOSTASE
- Glycogenese (insuline)
- Glycogenolyse / Gluconeogenese (glucagon)

Disclaimer Educatief Gebruik

Dit leermiddel is uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden en anatomische studie. Het is niet bedoeld voor klinische diagnostiek of medische besluitvorming.

1 Stap 1: Kaart Voorzijde Analyseren

Bestudeer de macroscopische kwabben en de vasculaire instroom (arteria hepatica en vena portae) zonder direct op de achterzijde te kijken.

2 Stap 2: Recall van Lobulaire Fysiologie

Benoem actief de vier functionele kerntaken (metabolisme, galproductie, detoxificatie, glycogeenopslag) en de microcirculatie van triade naar vena centralis.

3 Stap 3: Zelfevaluatie en Spaced Repetition

Keer de kaart om en controleer de termen. Sorteer de kaart in uw herhalingscyclus (bijv. Leitner-systeem) op basis van uw herinneringssucces.

GALBLAAS & GALWEGEN



GALBLAAS EN GALWEGEN: VOORZIJDE

Flashcard u34 • Orgaansteslel: Spijsverteringssteslel (Systema Digestorium)

- Vesica biliaris (galblaas): fundus, corpus en collum
- Ductus cysticus met plicae spirales (spiraalklep van Heister)
- Ductus hepaticus dexter et sinister naar ductus hepaticus communis
- Ductus choledochus (hoofdgalweg) en verloop dorsaal van duodenum en pancreas
- Ductus pancreaticus (Wirsung) en uitmonding in ampulla hepatopancreatica
- Papilla duodeni major (papil van Vater) en sfincter van Oddi

Kleurcodering Systeem

Groen markeringsvlak: Interne organen en spijsverteringsstelsel.

Deze kaart is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden.

KAARTACHTERZIJDE: FYSIOLOGIE & CONCENTRATIEMECHANISME

Orgaansteslel / Spijsvertering

FYSIOLOGIE EN FUNCTIE: ACHTERZIJDE

Essentiële leerstof en functionele toelichting bij Vesica Biliaris en Ductus Choledochus.

- **Galconcentratie:** actieve resorptie van water en elektrolyten concentreert hepatische gal tot wel tienvoudig in het galblaaslumen.
- **Hormonale contractie:** vetzuren en aminozuren in het duodenum stimuleren entero-endocriene I-cellen tot secretie van cholecystokinine (CCK).
- **Galuitdrijving:** CCK induceert contractie van de gladde musculatour in de galblaaswand en relaxatie van de sfincter van Oddi.
- **Vetemulgering:** galzouten verlagen de oppervlaktespanning van vetdruppels, vormen micellen en vergroten het bereik voor intestinaal pancreaslipase.
- **Enterohepatische circulatie:** reabsorptie van ca. 95% van de galzouten in het terminale ileum via het poortadersysteem terug naar hepatocyten.





Disclaimer Educatief Gebruik

Uitsluitend bestemd voor anatomisch onderwijs en zelfstudie; geen medisch diagnostisch instrument.

FLASHCARD PANCREAS - VOORZIJDE



PANCREAS (ALVLEESKLIER)

Anatomische leertracer: orgaanstelsel spijsvertering & endocrien systeem. Bestudeer de anatomische oriëntatie van caput, corpus en cauda pancreatis en het afvoergangs-systeem naar het duodenum.

- Caput pancreatis (alvleesklierkop) rust in de C-bocht van het duodenum
- Corpus pancreatis (alvleesklierlichaam) loopt horizontaal achter de maag
- Cauda pancreatis (alvleesklierstaart) reikt tot aan het hilum van de milt
- Ductus pancreaticus (gang van Wirsung) mondt uit in de papilla duodeni major

Educatieve Disclaimer
Dit leermiddel is uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden en anatomiestudie. Het vormt geen medische diagnose of behandelrichtlijn.

FLASHCARD PANCREAS - ACHTERZIJDE

FUNCTIONELE FYSIOLOGIE & HISTOLOGIE

De alvleesklier vervult zowel een vitale exocriene als endocriene functie binnen de homeostase en de spijsvertering:

- Exocriene acini: Produceren dagelleJs pancreassap met inactieve zymogenen en enzymen (amylase voor zetmeel, lipase voor lipiden, en proteasen zoals trypsine en chymotrypsine) ter neutralisstie en vertering in het duodenum.
- Endocriene ielandjes van Langerhans: Verspreide celclusters die hormonen direct aan de bloedbaan afgeven (bëtacellen synthetiseren insuline; alfacellen synthetiseren glucagon; deltacellen produceren somatostatine).
- Ductus pancreaticus accessorius (gang van Santorinij: Aanwezig als anatomische variant voor drainage naar de papilla duodeni minor.
- Topografische ligging: Retroperitoneaal gelagen ter hoogte van wervels L1-L2, nauw verbonden met de arteria en vena mesenterica superior.

Zelfevaluatie (Beheersing 1-5): ○ ○ ○ ○ ○

Persoonlijke geheugensteun / Aantekening:

Educatieve Disclaimer
Dit leermiddel is uitsluitend bestemd voor educatieve dooleinden en anatomiestudie. Het vormt geen medische diagnose of behandelrichtlijn.

Studiemethode: Spaced Repetition
Test actieve herinnering: bedeek de achterzijde, noem de functies van de drie hoofdenzymen en hormonen op basis van de kaartvoorzijde, en herhaal na 1, 3 en 7 dagen.

Stap 1: Actieve herinnering (Voorzijde)
Bekijk het diagram op de voorzijde en benoem caput, corpus, cauda en de ductus pancreaticus zonder te spieken.

Stap 2: Fysiologie teetsen (Achterzide)
Draai de kaart om en controleer de werking van exocriene enzymen (lipase, amylase, proteasen) en de endocriene hormonen (insuline, glucagon).

Kende je zowel de endocriene als exocriene functies foutloos?

Ja, volleejg correct gereproduceerd
⇩
Plaats de kaart in de herhalingsbak voor over 5 dagen.

ee, twijfel bij enzymen of hormooncellen
⇩
Herhaal deze kaart morgen opnieuw tijdens de actieve leersessie.

DUNNE DARM

Orgaanstelsel-kleurcode: Oranje/Oker. Snijd langs de buitenste markeringen voor dubbelzijdig ggbruik in het flashcard-systeem.



DUNNE DARM: DUODENUM, JEJUNUM EN ILEUM

Anatomische structuren van de dunne darm: plicae circulares, villi intestinales en mesentiale vascularisatie.

- **Duodenum (twaalfvingerige darm):** retroperitoneale C-lus rond de pancreaskop; ontvangt chymus, gal en pancreassap via de papilla duodeni major.
- **Jejunum (nuchtere darm):** gekenmerkt door hoge, dicht opeengepakte plicae circulares (plooien van Kerckring) voor maximale oppervlaktevergroting.
- **Ileum (kronkeldarm):** distaal traject met afnemend plooireliëf en prominente aggregaten van lymfefollikels (Peyer-plaques) in de submucosa.
- **Vascularisatie:** arteria mesenterica superior vertakt in jejunale en ileale arteriën, verbonden via arteriële arcaden en vasa recta.
- **Darmvlokken (villi intestinales):** microscopische uitstulpingen bekleed met enterocyten en microvilli (borstelzoom), centraal voorzien van een lacteaal (chylvat) en capillair netwerk.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

FLASHCARD 36 – ACHTERZIJDE (FYSIOLOGIE & ABSORPTIE)

GASTROINTESTINAAL SYSTEEM

FYSIOLOGIE & FUNCTIONELE ANATOMIE

Overzicht van de enzymatische digestie, membraantransport en enterale immuniteit over het verloop van de dunne darm.

- **Enzymatische afbraak:** vertering van koolhydraten en peptiden door borstelzoomenzymen (o.a. lactase, maltase, peptidasen) en pancreasamylase/proteasen.
- **Nutriëntenabsorptie:** monosachariden en aminozuren passeren via actief transport en gefaciliteerde diffusie direct naar het mesenteriale veneuze capillairnetwerk richting poortader.
- **Lipidentransport:** vetzuren en monoglyceriden worden verpakt in chylomicronen en opgenomen via de centrale lactealen van het lymfestelsel.
- **Enterale immuunrespons:** Peyer-plaques in het ileum bevatten M-cellen die antigenen uit het darmlumen bemonsteren ter stimulatie van plasmacellen en secretoir IgA (sIgA).

EDUCATIEVE DISCLAIMER

Deze flashcard dient uitsluitend voor anatomisch en fysiologisch onderwijs. Het materiaal is niet bedoeld als klinisch diagnostisch instrument of medisch behandeladvies.

NUTRIËNTENABSORPTIE VIA DE ENTEROCYT



CHYLOMICRONEN NAAR DE LACTEAL



PEYER-PLAQUE (ILEUM)



1 STAP 1: ACTIEVE HERINNERING (VOORZIJDE)

Bekijk het schema aan de voorzijde, noem de drie anatomische segmenten en verklaar de functie van de plicae circulares en het vaatbed zonder de toelichting te raadplegen.

→

2 STAP 2: ZELFCONTROLE (ACHTERZIJDE)

Draai de kaart om en verifieer de mechanismen van enzymatische affraak, de absorptieroutes van vetten versus koolhydraten en de locatie van Peyer-plaques.

→

3 SPACED REPETITION ARCHIVERING

Plaats de kaart bij een correct antwoord in het volgende herhalingsinterval (bijv. Leidner-box 2 of 3); herhaal bij twijfel binnen 24 uur.

Deze flashcard dient uitsluitend voor anatomisch en fysiologisch onderwijs. Het materiaal is niet bedoeld als klinisch diagnostisch instrument of medisch behandeladvies.

DIKKE DARM: COLON & CAECUM



DIKKE DARM: COLON & CAECUM

De dikke darm (intestinum crassum) vormt het laatste traject van het gastro-intestinale stelsel. Dit orgaan verzorgt de absorptie van water en elektrolyten, huisvest het darmmicrobioom en transporteert onverteerde resten richting het rectum.

- Caecum (blinde darm) met Appendix vermiformis
- Colon ascendens (opstijgend deel)
- Colon transversum (dwarslopend deel)
- Colon descendens (dalend deel)
- Colon sigmoideum (S-vormig deel)
- Karakteristieke structuren: Haustra en Taeniae coli

Educatieve Disclaimer
Dit leermiddel is uitsluitend bestemd voor educatieve en studie-doeleinden en dient niet als medische diagnostiek of behandelingsadvies.

FYSIOLOGIE & FUNCTIE

Fysiologie & Functie van het Intestinum Crassum

De achterzijde van deze flashcard analyseert de fysiologische processen in de dikke darm en de betekenis van de structurele onderdelen.

Waterresorptie

Terugwinning van het leeuwendeel van vloeistoffen uit chymus ter indikking tot feces.

Darmmicrobioom



Fermentatie van niet-verteerbare voedingsvezels en synthese van vitamine K en B-vitaminen.

Elektrolytenbalans



Actief transport van natrium en passieve osmose ter handhaving van de homeostase.

Fecestransport & Peristaltiek



Segmentatiebewegingen in haustra en massabewegingen naar het colon sigmoideum en rectum.

Studiemethode: Spaced Repetition

Test actieve herinnering: noem blind de 4 hoofddelen en 2 specifieke wandkenmerken voordat je deze toelichting controleert.

TIP

Klinische & Anatomische Relaties

Overzicht van belangrijke anatomische overgangen en klinische markers:



- Flexura coli dextra (leverhoek): Overgang tussen colon ascendens en colon transversum.
- Flexura coli sinistra (milthoek): Overgang tussen colon transversum en colon descendens.
- Appendix vermiformis: Bevat geassocieerd lymfatisch weefsel (MALT) en mondt uit in het caecum.

Deze flashcard is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden.

NIEREN: RENES EN NEFRON



STRUCTUUR: RENES EN NEFRONALE ARCHITECTUR

Systeem: Urinestelsel (Organen & Excretie). Overzicht van macroscopische renale structuren en het functionele nefron.

- **Cortex renalis** (niercortex / nierschors): Buitenste weefsellaag met glomeruli en gekronkelde tubuli.
- **Medulla renalis** (niermerg) & **Pyramides renales** (mergpiramiden): Bevatten de lussen van Henle en verzamelbuizen.
- **Pelvis renalis** & **Calices** (nierbekken en kelken): Opvang en afvoer van de uiteindelijke urine richting de ureter.
- **Nefronale micro-architectuur**: Glomerulus in het kapsel van Bowman, proximale tubulus, lis van Henle, distale tubulus en verzamelbuis.

Kleurcodering & Sortering

Kleurcode: Oranje/Amethist (Orgaanstelsels: Urinewegen).

Gebruik de snijlijnen en afloopmarge voor dubbelzijdig printen en snijden.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

FYSIOLOGIE: FILTRATIE & RAAS

FYSIOLOGIE EN REGULATIE

Functie, homeostase en endocriene regulatiemechanismen van de nier.

- **Glomerulaire Filtratie:** Passieve ultrafiltratie van bloedplasma onder invloed van hydrostatische druk in het kapsel van Bowman.
- **Tubulaire Reabsorptie & Secretie:** Selectieve heropname van water, elektrolyten en glucose; actieve uitscheiding van afvalstoffen (ureum, creatinine, H+).
- **Bloeddrukregulatie (RAAS):** Juxtaglomerulaire cellen scheiden renine af bij verlaagde perfusiedruk, wat leidt tot angiotensine II- en aldosteronactivatie.
- **Erytropoëtineproductie (EPO):** Stimulatie van erytrocytvorming in het beenmerg in reactie op renale weefselhypoxie.

Educatieve Disclaimer

Dit materiaal dient uitsluitend voor educatieve en anatomische studiedoeleinden en vormt geen medische diagnose of behandelrichtlijn.

1 GLOMERULAIRE FILTRATIEBARRIËRE



2 TUBULAIRE REABSORPTIE & SECRETIE



3 RENINE-ANGIOTENSINE-ALDOSTERON CASCADE



4 ERYTROPOËTINESECRETIE (EPO)



Dit materiaal dient uitsluitend voor educatieve en anatomische studiedoeleinden en vormt geen medische diagnose of behandelrichtlijn.

URINEWEGEN & BLAAS



URETERES EN VESICA URINARIA: STRUCTUUR EN OVERZICHT

Systeem: Urinair Stelsel (Organen & Afvoerwegen) — Flashcard U40 (Zijde A: Structuur & Identificatie).

- **Ureteres** (bilateraal retroperitoneaal verloop vanaf het nierbekken)
- **Vesica Urinaria** (musculaire blaaswand met m. detrusor)
- **Trigonum Vesicae** (gladde driehoekige bodemzone tussen ostia ureterum en ostium urethrae internum)
- **Urethra** (afvoerende buis met interne en externe sfinctercomplexen)

Kleurcodering Orgaanstelsels: Urinair Stelsel

Oranje/Amber kleurmarkering voor het urinaire stelsel.
Lijn de kaart uit met snijtekens op 85 x 125 mm formaat.

— Alleen voor educatief gebruik. —

FUNCTIONELE FYSIOLOGIE & REGULATIE

Flashcard U40 (Zijde B: Transport, Opslag en Mictieregulatie).

Peristaltisch Urinetransport:
Gladde spiercellen in de ureterwand wekken ritmische peristaltische contractiegolven op (1-5 per minuut) om urine anafhenkelijk van zwaartekracht naar het lumen van de blaas te stuwen.

Blaasopslag en Detrusor-dynamiek:
De relaxatie van de musculus detrusor vangt toenemend volume op met behoud van lage druk (fysiologische capaciteit circa 300-500 ml). De schuine intramurale inmonding van de ureters werkt als functioneel ventiel tegen vesicoureterale reflux tijdens blaasexpansie.

Neurogene Mictieregulatie:
Parasympathische activatie (sacrale segmenten S2-S4, n. pelvicus) induceert detrusorcontractie en ontspanning van de m. sphincter urethrae internus. Somatische controle via de nervus pudendus (S2-S4) reguleert de willekeurige ontspanning van de m. sphincter urethrae externus.

Centrale Coördinatie:
Het pontiene mictiecentrum (PMC) in de hersenstam coördineert blaaslediging zodra cerebrale inhibitie bewust wordt opgeheven.

PERISTALTIE IN DE URETER



MICTIE-INNERVATIE



EDUCATIEVE TOELICHTING & DISCLAIMER
Uitsulitend bestemd voor educatief en didactisch gebruik door studenten en docenten. Bevat geen medisch diagnostisch of behandeladvies.

STAPPEN

1. **Stap 1: Actieve Reproductie (Zijde A)**
Bekijk het diagram op de voorzijde. Benoem blindelings de bilaterale ureterverlopen, trigonum vesicae, detrusorlagen en de sfincters.

2. **Stap 2: Fysiologische Toetsing (Zijde B)**
Draai de kaart om en controleer de mictie-innervatie (sympathisch L1-L2 opslag vs. parasympathisch S2-S4 lediging) en peristaltiek.

Flashcard 41 Voorzijde: Encephalon

HERSENEN: ENCEPHALON

Cerebrale Hemisferen (Grote Hersenen) – Zenuwstelsel [Paars]



- Lobus frontalis (Frontale kwab)
- Lobus parietalis (Pariëtale kwab)
- Lobus temporalis (Temporale kwab)
- Lobus occipitalis (Occipitale kwab)

Educatieve Disclaimer
Dit leermiddel is uitsiluitend bestemd voor educatieve doeleinden en studieondersteuning. Het vormt geen medisch advies, klinische diagnose of behandelrichtlijn.

FUNCTIONELE ANATOMIE & LOKALISATIE

De cerebrale hemisferen vullen het grootste deel van de neurocraniale schedelholte (cavitas cranii) en zijn overkoepeld door het schedeldak (calvaria).



- **Lobus frontalis**: Verantwoordelijk voor hogere executieve functies, bewuste motorische planning (primaire motorische cortex) en spraakproductie (Broca-gebied).
- **Lobus parietalis**: Verwerking en integratie van somatosensorische input (aanraking, proprioceptie, pijn) en ruimtelijke oriëntatie.
- **Lobus temporalis**: Auditieve waarneming, taalbegrip (Wernicke-gebied), emotionele regulatie en geheugenvorming via de aanliggende hippocampus.
- **Lobus occipitalis**: Primaire en associatieve visuele verwerking en interpretatie van optische prikkels.

Spaced Repetition Tip

Test actieve herinnering: bedek de achterzijde en noem per hersenkwab de primaire fysiologische rol en relatieve ligging voordat u het antwoord controleert.

— Dit materiaal is uitsluitend beddeld voor educatieve doeleinden. —

CEREBELLUM



CEREBELLUM (KLEINE HERSENEN)

Flashcard #42 • Zenuwstelsel & Neuro-anatomie.
Bekijk de structuur op de voorzijde en benoem zelfstandig de ligging, primaire functies en neurale pedunculus-verbindingen voordat de toelichting wordt geraadpleegd.

- **Structuurnummer:** Flashcard 42 van 50
- **Orgaanstelsel:** Zenuwstelsel (Kleurcode: Paars)
- **Primaire focus:** Morfologie van de kleine hersenen en hersenstamrelaties

ACTIEVE ZELFTEST

Benoem hardop de drie pedunculus-verbindingen en de exacte begrenzing van de achterste schedelgroeve voordat de kaart wordt omgedraaid.

Voor educatieve doeleinden. Niet voor medisch gebruik.

Flashcard Achterzijde • Toelichting & Verbindingen



FUNCTIES

- motorische coördinatie
- evenwicht
- spiertonus

- afferente signaalbanen
- efferente signaalbanen

FUNCTIONELE EN ANATOMISCHE TOELICHTING

Het cerebellum bevindt zich dorsaal in de fossa cranii posterior (achterste schedelgroeve), direct caudaal van het tentorium cerebelli en dorsaal van de pons en het verlengde merg (medulla oblongata).

- **Coördinatie van willekeurige motoriek:** fijnregeling, precisie en vloeiende timing van doelgerichte spiercontracties.
- **Handhaving van evenwicht en houding:** continue verwerking van vestibulaire en proprioceptieve input.
- **Regulatie van de spiertonus:** zorgt voor posturale stabiliteit en soepele overgangen tussen spiergroepen.
- **Pedunculus cerebellaris superior:** verbindt het cerebellum met het mesencephalon en zendt voornamelijk efferente signalen uit naar de thalamus en rode kern.
- **Pedunculus cerebellaris medius:** de grootste verbinding, geleidt afferente vezels vanaf de pontiene kernen naar het cerebellum.
- **Pedunculus cerebellaris inferior:** verzorgt de afferente aanvoer van proprioceptieve informatie vanuit het ruggenmerg en de medulla oblongata.

Educatieve Disclaimer

Dit leermiddel dient uitsluitend voor academische en educatieve studiedoeleinden. Het is niet bedoeld als medisch advies, klinische diagnose of behandelrichtlijn.

TRUNCUS ENCEPHALI

HERSENSTAM (TRUNCUS ENCEPHALI) — VENTRAAL & LATERAAL AANZICHT

- Mesencephalon (Middenhersenen)
- Pons (Brug van Varol)
- Medulla Oblongata (Verlengde Merg)
- Uittreedplaatsen Hersenzenuwen III t/m XII

Kleurcodering Zenuwstelsel

Paarse kleurmarkering: zenuwstelsel en neuroanatomische structuren. Lijnkaart voor actieve herkenning en zelftest.

VENTRAAL AANZICHT



LATERAAL AANZICHT



Alleen voor educatieve doeleinden. Niet voor medisch gebruik.

STRUCTUUR & FUNCTIONELE REGULATIE

De hersenstam verbindt het cerebrum en het cerebellum met het ruggenmerg (medulla spinalis). Het fungeert als het vitale controlecentrum van het autonome zenuwstelsel en vormt het transmissiepunt voor stijgende sensorische en dalende motorische banen.

MESENCEPHALON

- Bevat de pedunculi cerebri en het tectum; verwerkt visuele en auditieve reflexen en bevat kernen voor n. oculomotorius (III) en n. trochlearis (IV).

PONS

- Schakelstation tussen grote hersenen en cerebellum via de pedunculi cerebellares; reguleert samen met het verlengde merg het ademhalingsritme; uittreedpunt voor n. trigeminus (V), n. abducens (VI), n. facialis (VII) en n. vestibulocochlearis (VIII).

MEDULLA OBLONGATA

- Bevat de vitale autonome centra voor regulatie van hartslag, arteriële bloeddruk, vaattonus en ademhaling, alsmede reflexcentra voor slikken, braken, hoesten en niezen; uittreedpunt voor n. glossopharyngeus (IX), n. vagus (X), n. accessorius (XI) en n. hypoglossus (XII).

AUTONOME REGULATIE

- Ademhalingscentra (pons en medulla oblongata)
- Vasomotorische centra (medulla oblongata)
- Regulatie hartslag en bloeddruk (medulla oblongata)
- Vaattonus (medulla oblongata)

CRANIALE ZENUWEN (III-XII)

III	n. oculomotorius
IV	n. trochlearis
V	n. trigeminus
VI	n. abducens
VII	n. facialis
VIII	n. vestibulocochlearis
IX	n. glossopharyngeus
X	n. vagus
XI	n. accessorius
XII	n. hypoglossus

EDUCATIEVE DISCLAIMER

Dit leermiddel is uitsluitend bestemd voor algemene anatomische educatie en studiebegeleiding. Het is niet bededld voor medische diagnostiek of klinische behandelbeslissingen.

STAPPENPLAN

1 STAP 1: ACTIEVE VISUALISATIE

Bekijk de voorzijde van de kaart en benoem de drie hoofdonderdelen (mesencephalon, pons, medulla oblongata) en de locaties van de craniale zenuwen zonder naar de achterzijde te kijken.

→

2 STAP 2: FUNCTIONELE TOETSING

Keer de kaart om en controleer de autonome controlemechanismen (ademhalings- en vasomotorische centra) en zenuwuittredingen.

→

3 STAP 3: SPACED REPETITION INTEGRATIE

Sorteer de kaart in bak 1 bij aarzeling (herhaling binnen 24 uur) of in bak 2 bij directe foutloze reproductie (herhaling na 3 dagen).

KENNISCONTROLE:

Weet je exact welke hersenzenuwen uittreden ter hoogte van de medulla oblongata?

Ja, foutloos benoemd (IX, X, XI, XII)

↓

Plaats de kaart in het herhalingsvak voor lange termijn (intervak 7 dagen).

Nee, twijfel over zenuwnummers of autonome functies

↓

Plaats de kaart terug in het dagelijkse oefenvak en bestudeer specifieik de sulcus retro-olivaris an de piramiden.

MEDULLA SPINALIS



MEDULLA SPINALIS (RUGGENMERG)

Systeem: Zenuwstelsel (Paars gecodeerd).
Kaartnummer: 44 van 50.

- Vlindervormige grijze stof: cornu anterius (motorisch) en cornu posterius (sensorisch)
- Omliggende witte stof: funiculus anterior, lateralis en posterior
- Canalis centralis: centraal kanaal met liquor cerebrospinalis
- Uittredende zenuwwortels: radix anterior en radix posterior met spinale ganglion

Educatief materiaal – niet voor medisch gebruik.

FUNCTIONELE EN ANATOMISCHE TOELICHTING

Het ruggenmerg vormt het centrale transmissie- en integratiekanaal tussen de hersenen en het perifere zenuwstelsel, gelegen binnen het benige canalis vertebralis.

- **Opstijgende banen (sensorisch):** geleiden prikkels (tast, pijn, temperatuur, proprioceptie) via o.a. de achterstrengen en tractus spinothalamicus naar de hersenen.
- **Afdalende banen (motorisch):** sturen willekeurige en autonome opdrachten vanuit de motorische cortex via o.a. de tractus corticospinalis naar de spinale motorneuronen in de voorhoorn.
- **Spinale reflexbogen:** interneuronen schakelen sensorische input direct door naar motorische output op segmentaal niveau (zoals de myotatische peesreflex).
- **Uittrede spinale zenuwen:** ventrale (motorische) en dorsale (sensorische) wortels verenigen zich per wervelsegment tot nervi spinales.

Educatieve Disclaimer & Kennistoetsing

Dit leermiddel dient uitsluitend voor educatieve en anatomische studiedoeleinden. Het is geen klinisch diagnostisch instrument of medische behandelrichtlijn.

ENDOCRIEN STELSEL | Flashcard #45: Schildklier — Voorzijde

SCHILDKLIER

(GLANDULA THYROIDEA) — VOORZIJDE



SCHILDKLIER (GLANDULA THYROIDEA) — VOORZIJDE

Schildklier (Glandula Thyroidea). Ventraal aansicht van de halsregio direct onder het strottenhoofd (larynx) en ventraal van de luchtpijp (trachea).

- **Lobus dexter** (rechterkwab): laterale uitbreiding langs het kraakbeen van de larynx en trachea.
- **Lobus sinister** (linkerkwab): spiegelbeeldige laterale kwab aan de linkerzijde van de trachea.
- **Isthmus glandulae thyroideae**: centrale weefselbrug die beide kwabben ventraal over de 2e tot 4e trachearing verbindt.
- **Cartilago thyroidea** (schildkraakbeen): craniaal gelegen anatomisch referentiepunt van de larynx.

Flashcard Identificatie

Note

Set: Visuele Flashcards Menselijke Anatomie | Kaart: 45/50 |
Systeem: Endocrien stelsel (Kleurcode: Oranje)

Deze flashcard is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

ENDOCRIER STELSEL · FYSIOLOGIE & REGULATIE

SCHILDKLIER (GLANDULA THYROIDEA) — ACHTERZIJDE

Fysiologie, hormonale secretie en klinische oriëntatie van de schildklier binnen het endocriene systeem.

- **Endocriene secretie:** Thyroxine (T4) en Tri-joodthyronine (T3) door folliculaire cellen; Calcitonine door parafolliculaire C-cellen.
- **Basale stofwisselingsregulatie:** T3 en T4 bepalen het basaalmetabolisme, zuurstofverbruik, mitochondriale ATP-productie en eiwitsynthese in vrijwel alle lichaamscellen.
- **Calciumhomeostase:** Calcitonine remt osteoclastenactiviteit en stimuleert renale calciumuitscheiding bij verhoogde bloedspiegels (antagonist van parathormoon).
- **Regulatie-as:** Hypothalamus (TRH) stimuleert de adenohypofyse (TSH), wat leidt tot schildklieractivatie via negatieve terugkoppeling.
- **Topografische relaties:** Ligt ventraal van de 2e-4e trachearingen; aan de dorsale zijde liggen de vier bijschildklieren (glandulae parathyroideae) en de nervus laryngeus recurrens.

Educatieve Disclaimer

Dit materiaal is uitsluitend bestemd voor educatieve en trainingsdoeleinden voor studenten en docenten. Het vormt geen medische diagnose, behandelplan of klinisch advies.

HYPOTHALAMUS-HYPOFYSE-SCHILDKLIER-AXIS



1 Stap 1: Actieve herinnering (Active Recall)

Bekijk de illustratie op de voorzijde zonder de toelichting te lezen. Benoem hardop de rechterkwab, de linkerkwab, de isthmus en de drie geproduceerde hormonen.

2 Stap 2: Fysiologische controle

Draai de kaart om en controleer de werking van T3, T4 en calcitonine ten aanzien van basaalmetabolisme en calciumhuishouding.

3 Stap 3: Spaced Repetition indeling

Plaats de kaart bij correcte reproductie in het bakje voor herhaling over 3 dagen; verplaats bij twijfel naar de dagelijkse herhaalsessie.

Eigen aantekeningen & ezelsbruggetjes:

BIJNIEREN (GLANDULAE SUPRARENALES)





BIJNIEREN (GLANDULAE SUPRARENALES)

Systeem: Endocrien stelsel / Urinewegrelatie (Kleurcode: Geel/Oranje).
Anatomische positie: retroperitoneaal, direct superieur en mediaal gelegen op de apex van beide nierpolen.

- **Rechter bijnier:** piramidaal/driehoekig van vorm, grenzend aan de vena cava inferior en lever.
- **Linker bijnier:** halvemaanvormig/crescentisch, grenzend aan de maag, pancreas en milt.
- **Opbouw:** perifeer omgeven door een fibreus kapsel, met een buitenste cortex en binnenste medulla.

Visuele Herkenning

Let op de karakteristieke kapvormige ligging direct op het vetkussentje boven de bovenpool van elke nier.

Deze informatie is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden.

FLASHCARD #46: BIJNIEREN (ACHTERZIJDE)

FUNCTIONELE ANATOMIE & HORMONALE PRODUCTIE

De bijnier bestaat functioneel en embryologisch uit twee gescheiden endocriene weefsels met specifieke hormonale functies:

- **Cortex (Bijnierschors):** Zona glomerulosa produceert mineralocorticoïden (aldosteron voor Na^+/K^+-balans en bloeddrukregulatie via het RAAS-systeem).
- **Cortex (Midden & Binnen):** Zona fasciculata produceert glucocorticoïden (cortisol voor glucosehomeostase en ontstekingsremming); Zona reticularis produceert zwakke androgenen (DHEA).
- **Medulla (Bijniermerg):** Gemodificeerd sympathisch ganglion; chromaffiene cellen secerneren catecholamines (adrenaline ~80%, noradrenaline ~20%) voor de acute 'fight-or-flight'-respons.



Klinische & Fysiologische Relevantie

Regulatie van bloeddruk, elektrolytenhuishouding en de lichamelijke stressrespons hangt direct af van de bijnierfunctie.

STUDIE-INSTRUCTIES & ZELFTOETS

Gebruik deze kaart binnen het **Leitner-systeem** voor actieve herhaling:

1. Bestudeer de voorzijde en benoem uit het geheugen de drie cortexzones en het merg.
2. Draai de kaart om en controleer de geproduceerde hormonen per zone.
3. Plaats de kaart in het juiste herhalingsvak op basis van uw beheersing.

Educatieve Disclaimer

Dit material dient uitsluitend voor anatomische en fysiologische studieddeleinden en vormt geen medische diagnose of behandelrichtlijn.



STAPPEN

1 Actieve Reconstructie

Kijk naar de ongekleurde schets en noem de positie van de linker vs. rechter bijnier.

2 Zonering Koppelopdracht

Verbind mentaal aldosteron, cortisol en adrenaline met de respectievelijke schors- en merglagen.

Milt • Visuele Flashcard (Voorzijde)

MILT (LIEN / SPLEN)

Lymfatisch Stelsel & Immuniteit • Flashcard 47 van 50

- **Systeemcode:** Geel (Lymfatisch stelsel en immunologische organen)
- **Nomenclatuur:** Lien (Latijn) / Splen (Grieks)
- **Topografie:** Linker bovenkwadrant (hypochondrium sinistrum)



Anatomische oriëntatie

De milt bevindt zich intraperitoneaal posterolateraal van de maagfundus en direct onder de linker koepel van het diafragma, beschermd door ribben 9 tot en met 11.

Deze afbeelding is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

Milt • Fysiologisch Profiel (Achterzijde)

FUNCTIONELE ANATOMIE & FYSIOLOGIE

De milt is het grootste secundaire lymfoïde orgaan van het menselijk lichaam en vervult essentiële functies binnen zowel de hematopoëtische filtering als de adaptieve immuunrespons.

- **Witte pulpa (pulpa alba):** Bevat lymfocytenaggregaten rond centrale arteriën (PALS) voor actieve antigeendetectie en immuunrespons tegen bloedoverdraagbare pathogenen.
- **Rode pulpa (pulpa rubra):** Bestaat uit miltstrengen (strengen van Billroth) en sinusoïden voor kwaliteitscontrole en afbraak van verouderde erytrocyten en trombocyten.
- **Bloedopslag:** Fungeert als reservoir voor bloedplaatjes en monocyten die seel gemobiliseerd kunnen worden bij weefselschade of **hemorragie**.



Klinisch-educatieve opmerking

Wegens de hoge vascularisatie en kwetsbare **bindweefselkapsel** is de milt gevoelig voor scheuring bij stomp abdominaal trauma aan de linkerflank. Dit leermiddel **dient uitsluitend voor onderwijsdoeleinden en vervangt geen klinische diagnostiek.**

LEITNER — STAPPENPLAN

1 Stap 1: Actieve herinnering

Bekijk de schematische positie van de milt ten opzichte van de maagfundus en het diafragma zonder de achterzijde te raadplegen.

2 Stap 2: Benoem de structuren

Benoem de **hilum splenicum**, a. splenica en het onderschied tussen rode en witte pulpa hardop.

3 Stap 3: Controle en consolidiatie

Controleer de fysiologische functies van erytrocytenfiltratie en lymfoïde afweer, en categoriseer de kaart volgens uw Leitner-box.

Zelfevaluatie (Direct gekend / Herhaling nodig na 3 dagen):

_____

Kenniscontrole:

Beheerst u de ligging en de tweedeling van pulpa alba versus pulpa rubra?

- Beide onderdelen vlot opgeroepen uit het geheugen → Plaats kaart in Leitner-stapel 3 (wekelijkse herhaling).
- Functie of relatie met diafragma/maag verward → Plaats kaart terug in Leitner-stapel 1 voor herhaling binnen 24 uur.

— Deze leermiddel dient uitsluitend voor onderwijsdoeleinden en vervangt geen klinische diagnostiek. —

LYMFEKLIEREN & DUCTUS THORACICUS



LYMFEKLIEREN EN DUCTUS THORACICUS

Systeem: Orgaanstelsels / Lymfestelsel & Immuniteit.
Kaartnummer: 48 van 50.

- Cervicale lymfeklieren (halsregio): filteren lymfevocht uit hoofd en hals.
- Axillaire lymfeklieren (okselregio): draineren de bovenste ledematen en de borstwand.
- Inguinale lymfeklieren (liesregio): filteren lymfevocht afkomstig uit de onderste ledematen en het bekkengebied.
- Ductus thoracicus (grote borstbuis): centraal verzamelvat dat lymfe uit het onderlichaam en de linkerlichaamshelft draineert naar de linker vena subclavia.

IDENTIFICATIE & ORIËNTATIE

Let op het asymmetrische drainagepatroon: de ductus thoracicus draineert ongeveer driekwart van het lichaam, terwijl de rechter ductus lymphaticus alleen het rechter bovenkwadrant verzorgt.

Deze kaart is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden.

FYSIOLOGIE & FUNCTIE

Fysiologische Functies en Vloeistoftransport

De achterzijde van deze flashcard vat de drie kernfuncties samen van het lymfevatenstelsel en de lymfeklieren in de humane fysiologie.

- **Vloeistofbalans:** terugvoer van overtollig interstitieel vocht en eiwitten vanuit de weefsels naar het veneuze vaatstelsel via de lymfebanen.
- **Immuunbewaking:** fagocytose van pathogenen en cellulaire afvalstoffen in de lymfeklieren, gecombineerd met antigeenpresentatie en activatie van T- en B-lymfocyten.
- **Lipidentransport:** opname en transport van verteerde voedingsvetten (chylomicronen) uit het maag-darmkanaal via de gepecialiseerde darmlymfvaten (lactealen) naar de cisterna chyli en ductus thoracicus.

Studiemethode & Spaced Repetition

Sorteer deze kaart na het overhoren in **stapel 1**. (dagelijks herhalen bij twijfel) of **stapel 2/3** (wekelijise controle bij parate kennis van ligging en drainagegebied).

1 Stap 1: Actieve herinnering (Voorzijde)
Bekijk de regionale lymfestations op de kaart en benoem het verloop van de ductus thoracicus en zijn uitmonding.

2 Stap 2: Fysiologische controle (Achterzijde)
Controleer de drie kernfuncties: vloeistofterugvoer, immuunrespons en vetabsorptie uit het verteringsstelsel.

1 VLOEISTOFBALANS & CAPILLAIR UITWISSELING



Capillair uitwisseling van vocht en eiwitten met terugvoer via de lymfebanen naar het veneuze vaatstelsel.

2 LYMFKNOOP & IMMUUNBEWAKING



Lymfeknoop met lymfefollikels voor immuunbewaking: fagocytose, antigeenpresentatie en activatie van T- en B-lymfocyten.

3 INTESTINALE VILLI & LACTEAL



Opname en transport van verteerde voedingsvetten (chylomicronen) via de lactealen naar de cisterna chyli en ductus thoracicus.

Educatieve Disclaimer

Dit leermiddel is uitsluitend bestemd voor educatieve doeleinden ten behoeve van studenten en docenten. Het bevat gestandaardiseerde anatomische en fysiologische basisconcepten en is nadrukkelijk niet bedoeld voor medische diagnostiek of behandeladvies.

Flashcard 50 Voorzijde — Coronale Doorsnede Ovaria en Uterus

UTERUS & OVARIA



STRUCTUUR EN IDENTIFICATIE (VOORZIJDE)

Vrouwelijk **Voortplantingsstelsel:** Ovaria en Uterus (Coronale doorsnede in situ binnen het kleine bekken).

- **Uterus:** fundus uteri, corpus uteri, isthmus en cervix uteri (baarmoederhals)
- **Wandopbouw uterus:** endometrium (stratum functionale en basale), myometrium (gladde spierlaag) en perimetrium
- **Tuba uterina (salpinx):** infundibulum met fimbriae, ampulla en isthmus
- **Ovaria:** cortex met follikels in verschillende rijpingsstadia en vasculair medullagebied
- **Ondersteunende ligamenten:** ligamentum latum uteri, ligamentum ovarii proprium en ligamentum suspensorium ovarii met ovariële vaten

Oriëntatie & Herkenning

Let op de anatomische ligging van het infundibulum en de fimbriae die als een trechter over het ovarium vallen om de geovuleerde ööcyt op te vangen in de ampulla.

— Deze afbeelding is uitsluitend bedeeld voor educatieve doeleinden. —

FYSIOLOGIE & CYCLUS

Flashcard 50 Achterzijde — Oögenese, Hormoonfuncties en Cyclus

FUNCTIONELE EN FYSIOLOGEISCHE INTEGRATIE (ACHTERZIJDE)

De vrouwelijke voortplantingsorganen voeren gecoördineerde cyclische functies uit onder invloed van de hypothalamus-hypofyse-ovarium-as.

- **Oögenese:** Meiotische rijping van primaire oöcyten naar secundaire oöcyten binnen rijpende follikels onder invloed van follikelstimulerend hormoon (FSH)
- **Endocriene secretie:** Granulosacellen en thecacellen produceren oestrogenen; het na ovulatie gevormde corpus luteum secreteert progesteron en oestrogeen
- **Menstruele cyclus:** Folliculaire/proliferatieve fase (endometriumopbouw door oestrogeen), luteale/secretiefase (klieractiviteit en vascularisatie door progesteron) en desquamatie (menstruatie)
- **Fertilisatie & Nidatie:** Bevruchting vindt fysiologisch plaats in de ampulla van de tuba uterina; transport van de blastocyste duurt circa 3 tot 5 dagen, waarna implantatie in het endometrium volgt

Educatieve Disclaimer
Dit leermateriaal is uitsluitend bestemd voor educatieve en trainingsdoeleinden en dient niet als medisch advies, klinische diagnostiek of behandelinstructie.

HORMOONINTERACTIE EN CYCLUS



OÖGENESE: STADIA

	Stadium	Beschrijving	Timing
1	**Oogonium**	Mitotische deling (foetale periode)	Foetale periode
2	Primaire oöcyt	Start meiose I, profase I (arrest)	Foetale periode tot puberteit
3	Secundaire oöcyt	Meiose I voltooid (voor ovulatie)	Vanaf puberteit tot ovulatie
4	**Rijpe oöcyt (ovum)**	Meiose II (arrest in metafase II, voltooid bij bevruchting)	Bij ovulatie (en na bevruchting)

ENDOMETRIUM: VERANDERINGEN

Fase	Kenmerken	Hormonen
Menstruele fase	• Afbraak stratum functionale • Bloeding • Vasculaire spasmen	Daling progesteron & oestrogeen
Proliferatieve fase	• Opbouw endometrium • Kliergroei • Angiogenese	Oestrogeen
Secretory fase	• Klieractiviteit • Vascularisatie • Klaar voor nidatie	Progesteron (+ oestrogeen)

STAPPENPLAN

1. **Stap 1: Actieve heninnering** (Voorzijde)
   Bekijk de schematische coronale doorsnede. Identificeer blindelings het verloop van het lumen van cavitas uteri naar tuba uterina en benoem de anatomische begrenzingen van heit ligamentum latum.
2. **Stap 2: Fysiologische controle** (Achterzijde)
   Controleer de fasen van de ovariële cyclus ten opzishte van de endometriale cyclus en reproduceer hoe een daling in progesteron leidt tot arteriële spasmen en menstruatie.
3. **Stap 3: Spaced Repetition**
   Plaats de kaart in de herhalingsbak op basis van beheersing: direct gealaagd (herhaal over 5 dagen) of twijfel over structuren/hormonen (herhaal morgen).

Eigen aantekening:
Verloop van arteria en vena ovarica binnen ligamentum suspensorium

Zelf-toetsing:
Histo-architectuur van het stratum functionale versus stratum basale

Vindt er succesvelle nidatie plaats van een levensvatbare blastocyste?

Ja: HCG-signalering vanuit de syncytiotrofoblast behoudt het corpus luteum

↓

Het corpus luteum blijft progesteron en oestrogeen afgeven om het endometrium intact te houden en menstruatie te vorokrmen totdat de placenta de hormoonproductie overneemt.

Nee: Geen blastocyst-implantatie en afwezigheid van HCG

↓

Het corpus luteum degenereert tot een fibreus corpus albicans; de daling in progesteron en oestrogeen triggert de afbraak en afstoting van het stratum functionale (menstruatie).